

CASO CLINICO 3

Paciente femenino de 23 años, acude al servicio de urgencias por presentar sangrado transvaginal de color rojo oscuro con evolución de 5 días. Menciona que hace tres días inicio con dolor tipo colico en fosa iliaca derecha, acompañado de nauseas, vomito.

Antecedentes ginecoobstetricos: menarca 14 años, IVSA 20 años, método de planificación familiar preservativo, en ocasiones. FUM incierta, de ciclos irregulares.

EF: signos vitales TA:100/50, FR:24rpm, FC:80lpm, T:36.79C, TALLA: 1.60M, PESO:44kg.

Consiente, alerta y orientada en las 3 esferas, adecuada coloración e hidratación de piel y mucosas, abdomen plano, blando, doloroso a la palpación en ambas fosas iliacas. Al tacto vaginal encontramos cavidad eutermica, cérvix cerrado, sin cambios cervicales, con presencia de sangrado.

Dx presuntivo: embarazo ectópico

Pruebas a solicitar

GCH

US transvaginal

BH

Paciente que acude al servicio de urgencias por presentar sangrado transvaginal con evolución de 5 días, se realizaron pruebas de GHC lo cual salieron positivos para embarazo. La BH: E:3.5, HB:10.1 HMT: 40.3 VCL:88.6 VCM:28.4 PLAQUETAS:228.3. US transvaginal no detecto embarazo intrauterino ni liquido libre en cavidad

Dx definiivo: embarazo ectópico