

“Caso clínico equipo 3 (caso 3)”.

Paciente femenino de 25 años de edad, casada, la cual acude al servicio de urgencias por presentar desde hace 5 días sangrado transvaginal color rojo oscuro. Refiere además que hace 3 días inició con dolor tipo cólico intermitente en fosa iliaca derecha. Acompañada de nauseas, vómito Menarca 14 años, IVSA 20 años, Utiliza Preservativo en ocasiones, tuvo un aborto espontáneo hace 9 meses por infección vaginal. FUM incierta.

Pruebas iniciales

Subunidad beta de hCG positiva de 1600mU/ml

US transvaginal:

No detecta embarazo intrauterino ni líquido libre en cavidad,

Signos vitales:

TA: 100/50 mmHg

FR: 24 rpm

FC 80 Ipm

T36.79C

Talla 1.60m

IMC: 17 kg/m².

Peso 44 kg

Laboratoriales (BH):

ERITROCITOS. 3.5

HEMOGLOBINA. 10.1

HEMATOCRITO: 40.3

VOLUMEN GLOBULAR MEDIO: 88.6

Hgb. CORPUSCULAR MEDIO: 28.4

CONT.MED.Hbg. CORPUSCULAR: 33.1

Plaquetas 228.3

Alumno: Mussolini Macnealy Paz

A la EF:

Consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, adecuada coloración e hidratación de piel y mucosas, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen plano, blando, doloroso a la palpación profunda en ambas fosas iliacas, peristalsis presente.

Al tacto vaginal:

Cavidad eutermica, cérvix posterior cerrado, sin cambios cervicales, con presencia de huellas de sangrado, extremidad sin alteraciones

Diagnóstico:

Embarazo ectópico

Alumno: Mussolini Macnealy Paz