



Universidad del sureste



Clínica Ginecología y Obstetricia

Cuadro Sipnotico

Tema: “Infecciones Vaginales”

Catedrático:

Alumna: Aurora Flor D’ Luna Dominguez Martinez

Medicina Humana

7mo Semestre

Tuxtla Gutierrez, Chis. A Octubre del 2022

| Patología | Agente etiológico | Factores de riesgo | Transmisión sexual | Cuadro clínicos | Flujo | diagnóstico (Frotis fresco) | Tratamiento Primera y segunda elección con dosis y duración del mismo. |
|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|--|--|--|--|
| Vaginitis Bacteriana | Gardnerella vaginalis, | Diabetes mellitus no controlada, inmunodeficiencia e hiperestrogenismo el uso de ropa sintética y ajustada así como de irritantes locales. | No | Secreción en la vagina y el vestibulo, no inflamación vulvar, olor a pescado | Minima | Frotis de exudado vaginal con tinción de Gram Cultivos vaginales | Ira: Metronidazol: 500 mg dos veces al día durante siete días Metronidazol: 250 mg tres veces al día durante siete días 2da: Clindamicina: 300 mg dos veces al día por siete día |
| Candidiasis | Candida Albicans | Reducción de la acidez vaginal (aumento del pH vaginal). Cambios en la flora microbiana de la vagina Cambios hormonales. Sistema inmunitario debilitado. | No | Hallazgos normales o eritema vulvar, edema, fisuras, lesiones satélites | Abundante, blanca Tipo queso cottage, y sin olor | Estudio microscópico de rutina | Ira: Clotrimazol 1% crema. Aplicar 5 g (un aplicador lleno) de la crema profundamente en la vagina y en la vulva por la noche por siete días, o Clotrimazol 2% crema. Aplicar 5 g (un aplicador lleno) de la crema profundamente en la vagina y en la vulva por la noche por tres días. 2da: Fluconazol, 150 mg una tableta en dosis única. Miconazol crema al 2%. Aplicar 5 g (un aplicador lleno) de la crema profundamente en la vagina y en la vulva por la noche por siete días. |
| Tricomonias vaginal | Trichomona v | Múltiples parejas | Si | Disuria, dolor abdominal, Prurito vulvar, Eritema de vulva y cervix - aspecto de fresa | Flujo blanco o amarillo, espumoso | Citología vaginal, frotis en fresco, cultivos vaginales | Ira: Metronidazol 2 g en dosis única a cualquier momento del embarazo, o Metronidazol 500 mg, dos veces al día por siete días. 2da: En caso de falla del tratamiento o recurrencia, repetir Metronidazol 500 mg por siete días más, hasta completar los 14 días. |

Bibliografía: [081GRR \(imss.gob.mx\)](http://081GRR(imss.gob.mx))

[GPC-Infeccion vaginal obstetrica.pdf \(cssr-ecuador.org\)](http://GPC-Infeccion_vaginal_obstetrica.pdf(cssr-ecuador.org))

[gpcsepsivaginal.pdf \(sld.cu\)](http://gpcsepsivaginal.pdf(sld.cu))