

Universidad del sureste

Dr. Alfredo López López

Urgencias medicas

Crisis asmática

Hannia del Carmen Salazar Jimenez

Crisis asmática

¿Que es?

Tratamiento

Cuadro clínico

son episodios caracterizados por un aumento progresivo de la dificultad para respirar, sensación de falta de aire, sibilancias, tos y opresión torácica, o una combinación de estos síntomas

La intensidad de la crisis puede ir desde una exacerbación leve de los síntomas hasta producir un paro cardiorrespiratorio, por lo que es importante evaluar los síntomas y signos del paciente para realizar una clasificación que permita otorgar el mejor tratamiento según la severidad del episodio

Dependiendo del tipo de exacerbación y una vez identificado el riesgo vital de la crisis asmática se procede a determinar el lugar de manejo y el tratamiento más adecuado. Es importante destacar que toda exacerbación que se considere como de riesgo vital, (paro cardiorrespiratorio inminente) debe ingresar a UCI ante la posibilidad de necesitar intubación orotraqueal y/o ventilación mecánica

Tambien

- Según la evaluación dinámica, se debe determinar donde se continuará tratamiento; en caso de buena respuesta (estable, asintomático, VEF1 >60%) se puede otorgar el alta con las respectivas indicaciones de tratamiento y control. Si la respuesta al tratamiento inicial no fue óptima, (Inestable, sintomático, VEF1 <60%) paciente debe ser hospitalizado pudiendo en algunos casos requerir de ingreso a UCI
- En general se recomienda en todos los casos una observación mínima de 60 minutos para confirmar la estabilidad del paciente previo al alta.