



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA MEDICINA HUMANA

Nombre: Arieni Darinka Pérez Alvarez

Docente: Dr. Miguel Basilio Robledo

Tema: Derechos sexuales

Grado: 3er semestre

Tapachula de Ordoñez a 04 de enero del 2023

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

patología

La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección en la cual los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia el esófago (tubo de deglución). Los alimentos van desde la boca hasta el estómago a través del esófago.

etiología

El esófago de Barret es una patología producida por la irritación importante y crónica de la mucosa esofágica, secundaria a la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Manifestaciones clínicas

Síntomas respiratorios

Apnea, sianosis, sibilancias y estridor, tos crónica.

Neumonías, laringomalacia, estenosis subglótica.

diagnostico

Los síntomas típicos de la ERGE son pirosis y regurgitaciones. La presencia de síntomas típicos 2 o más veces por semana en un paciente joven (menos de 50 años), sin datos de alarma, establecen el diagnóstico presuntivo de ERGE. En estos pacientes se recomienda una prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones

tratamiento

En los pacientes de ERGE con síntomas y alteraciones leves está indicado el uso de antagonistas de los receptores H2 (cimetidina, ranitidina, famotidina).

Gastritis aguda y cronica

patologia

La **gastritis aguda** suele estar causada por el consumo prolongado de algunos fármacos, como el ibuprofeno, la ingesta excesiva de alcohol o el estrés.

Gastritis crónica: Se produce cuando la enfermedad dura meses o incluso años. La principal causa de la **gastritis crónica** es la infección por la bacteria *Helicobacter pylori*.

etiologia

las gastritis agudas se corresponden unas veces con agentes externos y otras con agentes o productos metabólicos internos, por este motivo también se las clasifica respectivamente como gastritis exógenas y gastritis endógenas.

Manifestaciones clinicas

Malestar o dolor punzante o ardor (indigestión) en la parte superior del abdomen que puede empeorar o mejorar cuando comes, Náuseas, Vómitos, Sensación de saciedad en la parte superior del abdomen después de haber comido

diagnostico

La endoscopia gastrointestinal es un procedimiento para ver el revestimiento de la parte superior del aparato digestivo, incluso el esófago, el estómago y el duodeno.

tratamiento

La gastritis aguda causada por los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o por el alcohol puede aliviarse al dejar de consumir esas sustancias. Medicamentos antibióticos para eliminar la *Helicobacter pylori*, Medicamentos que bloquean la producción de ácido y promueven la recuperación, Medicamentos que neutralizan el ácido estomacal y Medicamentos para reducir la producción de ácido.

Úlcera péptica



patología



son llagas abiertas que aparecen en el revestimiento interno del estómago y la parte superior del intestino delgado. El síntoma más común de **la úlcera péptica** es el dolor de estómago.

etiología



Helicobacter pylori, AINES y aspirinas, acidez gástrica y Fx genéticos, factores hormonales y factores psicológicos.

Manifestaciones clínicas



El síntoma más común de una úlcera péptica es un dolor sordo o ardor en el estómago. La persona puede sentir el dolor en cualquier parte entre el ombligo y el esternón. Con más frecuencia el dolor: ocurre cuando el estómago está vacío, como entre comidas o durante la noche.

diagnostico



Endoscopia gastrointestinal y biopsia, tránsito gastrointestinal y Tomografía computarizada

tratamiento



Antibióticos, Bloqueadores H2 como la famotidina, Inhibidores de la bomba de protones (IBP) como el omeprazol y Cambios de estilo de vida, como dejar de fumar y no beber demasiado alcohol


Síndrome de intestino irritable

patología

es un trastorno frecuente que afecta al intestino grueso. Los signos y los síntomas incluyen cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, gases y diarrea o estreñimiento (o ambos). El síndrome de colon irritable es un trastorno crónico que se tiene que controlar a largo plazo.

etiología

La ultra sensibilidad del intestino es un hallazgo mayor en pacientes de SII. Cerca del 23% de pacientes desarrolla los síntomas después de una enteritis pesada.



Manifestaciones clínicas

Dolor, cólicos o hinchazón en el abdomen relacionados con la evacuación intestinal, Cambios en el aspecto de las deposiciones, Cambios en la frecuencia con la que se evacúan los intestinos

diagnostico

No existe una prueba para diagnosticar definitivamente el síndrome de colon irritable, Tipo de síndrome de colon irritable Para los fines del tratamiento, el síndrome de colon irritable se puede dividir en tres tipos, según los síntomas: estreñimiento predominante, diarrea predominante o mixto.

tratamiento

Loperamida, rifaximina (Xifaxan), eluxadoline (Viberzi), alosetrón (Lotronex)

Enfermedad diverticular

patología

es una afección que se presenta cuando se forman pequeñas bolsas o sacos que sobresalen a través de puntos débiles en la pared del colon.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas de la enfermedad diverticular podrían incluir estreñimiento, diarrea, dolor o distensión abdominal. La diverticulitis suele causar dolor abdominal, por lo general muy fuerte. Los expertos no están seguros de qué causa estas afecciones.

etiología

Se originan por pulsión debido a un aumento de la presión intraluminal, produciendo la pulsión de la mucosa a través de los puntos musculares débiles, correspondientes a vasos que irrigan la mucosa.

diagnostico

Una tomografía computarizada, una serie GI inferior, es mejor hacer la exploración con un contraste intravenoso cuando sea posible.

tratamiento

Los regímenes más frecuentemente utilizados son ampicilina (1g cada 6 h), metronidazol (500 mg cada 8 h) más gentamicina (4-7 mg por kg). En pacientes que presentan alergia a la penicilina, podría considerarse la ceftriaxona.