

POPPERS

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

ROLANDO DE JESUS PEREZ

Poppers

SON COMPUESTOS NITROGENADOS (NITRITO DE AMILO, NITRITO DE ISOBUTILO)



EL POPPER RELAJA ALGUNOS TIPOS DE MÚSCULOS INCLUIDA LA MUSCULATURA ANAL, LO QUE FACILITA LA PENETRACIÓN.

NUNCA DEBEN UTILIZARSE POR VÍA ORAL.



LA DURACIÓN DE EFECTOS ES DE UNOS POCOS MINUTOS. LOS CAMBIOS EN LA TENSIÓN ARTERIAL PRODUCEN UNA SENSACIÓN DE MAREO, TAQUICADIA Y "SUBIDÓN" EN LA CABEZA.

AY WEY, ME PASÉ



DE POPPERS


NO SE CONOCEN INTERACCIONES ENTRE LOS FÁRMACOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DEL VIH O Y LOS POPPERS. SIN EMBARGO, SE SABE QUE LOS INHIBIDORES DE LA PROTEASA (IPS) PUEDEN INCREMENTAR LOS EFECTOS DE LOS FÁRMACOS ANTI-IMPOTENCIA. EL USO SIMULTÁNEO DE POPPERS + IPS + FÁRMACOS ANTIIMPOTENCIA ES UNA COMBINACIÓN DESACONSEJADA POR EL RIESGO DE EFECTOS ADVERSOS GRAVES.

EFECTOS ADVERSOS:

LOS RIESGOS A LARGO PLAZO; LESIONES NEUROLÓGICAS, DEPRESIÓN RESPIRATORIA, DE DESOXIGENACIÓN DE LA SANGRE Y ANEMIA

DOLOR DE CABEZA, MAREO

DIFICULTA LA ERECCIÓN



FUENTE: CHEM-SAFE.ORG

