



*Nombre del Alumno: **Rebeca María Henríquez Villafruerte***

*Nombre del tema: **Cuadro sinóptico de Fármacos***

*Parcial: **4°***

*Nombre de la Materia: **Farmacología***

*Nombre del profesora: **Dr. Manuel Eduardo López Gómez***

*Nombre de la Licenciatura: **Medicina Humana***

*Semestre: **3°***

***San Cristóbal de las Casas, Chis, 18 de Diciembre de 2022.***

## Fenazopiridina:

### Presentación:

Tabletas: Caja de 20 tabs de 100mg.  
Caja de 24 tabs de 100mg.

### Farmacocinética y Farmacodinámica:

Se absorbe por vía oral, tiene biotransformación hepática y otros tejidos. Tiene una vida  $\frac{1}{2}$  de 8-12 hrs.

### Reacciones adversas y Seandamus:

Puede presentar cefalea o trastornos gastrointestinales, tales como dispepsia, náusea y vómito. Puede llegar a presentar tinte amarillento en la piel y escleróticas.

### Dosis:

Adultos: 200mg el día, junto o después de los alimentos.  
Niños mayores de 12 años: 100mg el día, junto o después de los alimentos.

### Vía de administración:

Oral.

## Nitrofurantoina:

### Presentación:

Capulas: Caja 40 caps, 100mg.  
Caja 40 caps, 50mg.

### Indicaciones:

Para el tx específico de las infecciones agudas no complicadas del tracto urinario causada por cepas sensibles de gérmenes patógenos Gram positivos y negativos.

### Dosis:

Adultos: 50 a 100mg 4 veces al día, la dosis mínima se recomienda a px con IUU no complicadas.  
Niños mayores de 12 años: 50mg 4 veces al día (máx de 40kg).  
Niños mayores de 12 años: 5 a 7mg/kg de peso en 24 hrs, dividida en 4 dosis (menor de 4kg).

### Vía de administración:

Oral.

## Nitrofurantoina

### Presentación:

Suspensión: Caja fro, 120ml  
Caja fro, 60ml

Dosis: Adulto: 50 a 100mg, 4 veces al día.  
Niños: 4 a 5mg/kg de peso (24hrs) dividida en 4 tomas.

Vía de administración: } Oral

### Indicaciones terapéuticas:

Para infecciones del ap. urinario

## Ciprofloxacino

### Presentación:

Caja: 10 tabs, 500mg 14 tabs, 500mg  
16 tabs, 500mg 28 tabs, 500mg  
18 tabs, 250mg

### Indicaciones terapéuticas:

Para el tx de infecciones como: gastrointestinales, infecciones del tracto genitourinario, uretritis gonocócica, meningitis, prostatitis, fiebre tifoidea, infección de tejidos blandos y otras infecciones causadas por microorganismos sensibles.

Vía de administración: } Oral

### Dosis:

Adulto: 500 u 750mg c/12hrs por 7 a 14 días.

Niño: 250mg u 500mg c/12hrs por 7 a 14 días.

Niño: No se recomienda en menores de 18 años.  
Puede causar artropatía.

## Ceftriaxona

### Presentación:

Caja Fco ampolla el polvo y ampollita de 1g, 1/3.5g/ml.  
Fco ampolla el polvo y ampollita de 500mg, 3x12mg/ml.

### Indicaciones:

Infecciones de vías resp, lvs, infecciones intracelulares  
meningitis, Septicemias, Infecciones de la piel y tej. blando,  
Infecciones óseas y de las articulaciones.

### Dosis:

Adultos y niños de 12 años de edad: 1 a 2gr al día en una sola aplicación.  
No debe exceder de 4gr. Para fe de la gravedad no complicada  
se aplica una sola dosis de 2gr/ml.  
Lactantes y niños pequeños: Segun la gravedad de la infección, de 50 a 75mg/kg/día,  
en una sola inyección al día o en dosis divididas: 1/12hrs, 2 a 3gr.

### Vía de administración:

I.M.

## Doxyciclina

### Presentación:

Comprimido: 100mg, 200mg.

### Indicaciones:

Infecciones de vías respiratorias,  
Infecciones de ep. urogenital,  
Infecciones, dermatológicas.

### Acción terapéutica:

Antibiótico.

### Dosis:

Adultos: 200mg el 1.º día de tx (comprimido en una sola dosis  
o 100mg (1/2 hr), seguidos por una dosis de mantenimiento  
de 100mg al día).  
En infecciones más severas 200mg 4 veces a lo largo del tx.

### Vía de administración:

Oral.

**Clotrimazol**

**Presentación:**

Crema, Tubo de 30g / 100g y 1g.

**Indicaciones terapéuticas:**

Tx de micosis de la piel debida a dermatofitos o levaduras, como dermatofitosis, Tinea pedis, tinea corporis, candidiasis topica, Tinea uuestrator, localizada en axilas, forax, manos y cara. eliminando los mohos. Símbolos de comeison, sudor, urticar y dermatitis.

**Via de administración:**

Cutánea.

**Dosis:**

- Dermatofitosis: 3 a 4 Semanas
- Entrañas: 2 a 4 Semanas
- Difteria Vegetar: 1 a 3 Semanas
- Neuritis o balanitis por candida: 1 a 2 Semanas.

**Clotrimazol V (clotrimazol)**

**Presentación:**

Óvulos, Caja 1 óvulo, 50mg  
Caja 3 óvulos, 200mg.

**Indicaciones terapéuticas:**

Infecciones poro en la región genital (vaginosis) causadas por hongos. Curalmente (aplicada) y para infecciones causadas por bacterias sensibles al "clotrimazol".

**Via de administración:**

Vaginal.

**Dosis:**

- Tx de dosis únicas: óvulo de 50mg. Aplicar 1 óvulo antes de acostarse.
- Tx de 3 días: Óvulo de 200mg. Aplicar en óvulo 1 noche durante 3 días consecutivos.

Metrizidazol (Flagyl)

Presentación:

Oral: Caja 10 o 20, Supmg.  
Caja de 200, 500mg.

Indicaciones:

Amebiasis, Tricomoniasis vaginal;  
Vaginitis no específica, Gardneria;  
Tx. control de infecciones mixtas  
quirúrgicas causadas por bacterias  
anaerobias sensibles.

Dosis:

Tricomoniasis:  
• Mujeres (vaginitis): 2gr. administrados 2 veces al día.  
Supmg. ltra.  
Vaginitis no específica: 1 o 2 o 3 gr. al día concomitante con el  
tx oral.

Vía de administración:

Vaginal.