



FARMACOLOGIA

TEMA:

MEDUCAMENTOS VISTO EN CLASES

DOCENTE:

DR. MANUEL EDUARDO LOPEZ GOMEZ

ALUMNA:

YESICA DE JESUS GOMEZ LOPEZ

Medicament
o visto

Paracetamol

Analgésicos y antipirético para control de dolor

Reacciones adversas: toxicidad, alteraciones en la formula sanguínea, dermatitis alérgica

Presentación: tabletas, suspensión, gotas, supositorios, ámpulas.

Dosis:
500mg/ 100ml
100ml/ 100ml
15ml/ 10mg/ml

Metamizol

Analgésico para el dolor agudo intenso o de fiebre alta.

Hipersensibilidad manifestada por erupción cutánea, asma, disnea.

Presentación: tabletas, suspensión, ámpulas.

Dosis: 500mg
2.5 y 1g /100/ml
1 y 2.5gr- 2.5g= 25mg

Clorfenamina

Alivia las reacciones alérgicas.

Efectos secundarios, cansancio o somnolencia.

Presentación: tabletas, suspensión

Dosis: 4 mg-1.0mg/kg/dosis
5mg/10ml/-0.2-0.4mg/kg7dia

Loratadin

Aliviar forma temporal los síntomas de la fiebre.

Efectos adversos: Sequedad de boca, nauseas, gastritis y erupción cutánea

Presentación: jarabe, solución, tabletas.

Dosis: 100mg/100ml
5ml/5ml

Sultametoxazol -trimetoprim

Actúan en sinergia contra una gran variedad de bacterias.

Pérdida de apetito.

Presentación: suspensión

Dosis: Fco.5ml

Dosis oral: intravenoso y muscular

2 tabletas 80mg/400mg C/12h tableta
160mg/800mgc712h (durante 7-10 días).

Niños: 2 meses dosis: 8-10mg kg/día%
12h

Dimeticona

Medicamento anti flatulento, alivia los síntomas de la acumulación de gases en el tracto gastrointestinal.

Afectos adversos: erupción cutánea, nauseas. Vómito y diarrea.

Presentación; tabletas.

Dosis: 7 en menores de 2 años 6 gotas al día 4-8 veces al día (antes de comer)

Metamizo pl

Trata el hipertiroidismo

Efectos secundarios: urticaria, prurito, asma, sudoración fría, disnea v asma.

Suspensión: tabletas

Dosis: c. 10 tbs 500mg

c. 20 tbs, 500 mg

Adultos 500mg/ 6-8 h

Buscapina

Para los cólicos menstruales y dolores en la región del abdomen.

Efectos secundarios: taquicardia, sequedad de boca, reacción cutánea, dishidrosis.

Presentación: tableta, recubierto.

Dosis: adulto y niños

1-2 tabletas/ 3 veces al día.

Plantago psyllium

Es un laxante que produce del bolo intestinal y se usa para tratar la constipación.

Efectos adversos, dolor de estómago, vomito.

Presentación: polvo

Dosis: adulto 1 cucharada mesclado con un vaso de agua/3 veces al día.

Niños de 7 años ½ cucharada (3.5mg).

Aluminio y maanesio

Para trastorno gastrointestinal que responde favorablemente.

Reacciones secundarias: la alcaluria originada por el uso prolongado de cualquier antiácido

Dosis: 1 cucharada (10-20g) 1h. Después de la comida.

Presentación: suspensión oral.

Metoclopramida

Para aliviar los síntomas provocados por el vaciamiento lento del estómago en personas que tiene diabetes.

Reacciones adversas: nauseas, vómito, diarrea, dolor de estómago dolor abdominal)

Presentación: solución oral,

Dosis: 0.3 a 0.5mg/kg% 3 al día caja de 100ml/100mg

Ranitidina

Tiramiento de la ulcera gástrica y duodenal.

Afectos adversos: dolor abdominal, estreñimiento, nauseas.

Presentación: tableta

Dosis: c.de tabletas. 30mg c. de 20 tabletas, 150 mg c. de 60 tabletas 300 mg adultos aguda – 150 mg/ 2 veces al día

Dextrometorfan

Alivia la tos, pero no trata la causa de la tos ni acelerara.

Afectos adversos: mareos, aturdimiento, somnolencia, nerviosismo, intranquilidad, nauseas, vomito.

Presentación: jarabe.

Dosis: 2-6 años- 2.5-7.5mg/4gh 15 mg/6-8h

Niños mayores de 12 años 10-30mg/ 4-8h

Beclometasona

Alivia la inflamación de la nariz.

Reacciones adversas: irritación nasal, boca, lengua o garganta y ronquera.

Presentación: aerosol

Dosis: 200 dosis/50 mg – 100mg

Asma leve, 200 a 600 mg
Asma moderado, 600 a 100mg
Asma severo: mayor a 100mg

Budesonida

Para dificultad para respirar, opresión en el pecho, sibilancia y tos.

Afectos adversos: dolor de cabeza, nariz congestionado o secreción nasal, dolor de garganta, diarrea.

Presentación: suspensión.

Dosis: adulto mayor de 65 años 1 a 2 dosis. Niños mayores 0.250 a 0.5/dosis al día

Ipratropio

Para prevenir el resoplo (respiración con silbido), dificultad para respirar.

Efectos adversos. Dolor de cabeza. Mareo, irritación de garganta, tos, sequedad de boca, nauseas.

Presentación: solución para nebulizar

Dosis: niños de 4-6 años. 0.4-10ml (8-20gr=0.25mg

Niños de (12 años-10 ml

Amoxicilina

Consiste en detener el crecimiento de las bacterias.

Efectos secundarios: erupción cutánea eosinofilia, angiodema, choque anafiláctico, náuseas, vómito, diarrea.

Dosis; 50mg/250mg/875mg

125mg, 200mg, 250mg

25mg-45mg/kg/día%3 día por 7 a 20 días.

Presentación: tabletas, suspensión, inyectable.

Aproximo

Se utiliza para aliviar el dolor y es un antiinflamatorio.

Reacciones secundarias: náuseas, vómito, dolor abdominal epigastálgica.

Presentación: tableta, suspensión.

Dosis: 250mg, 500mg
10mg/kg 2.5mg/kg c18h
100/125mg/5ml

Eritromicina

Se usa para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias.

Efectos secundarios: molestias estomacales, diarrea, vómito, dolor de estómago, pérdida de apetito.

Presentación: suspensión, tabletas.

Dosis: 200mg, 5ml
niños, 50mg/kg/día% 6-8 h
250mg-500mg c16h.