

# FARMACOLOGIA


## FARMACOLOGIA CLINICA EN LA ADOLESCENCIA

### DOCENTE:


Dr. Manuel Eduardo Lopez Gomez

### ALUMNA:

Ingrid Renata Lopez Fino



3ER SEMESTRE  
MEDICINA HUMANA



# FARMACOLOGÍA CLÍNICA EN LA ADOLESCENCIA

La adolescencia es el período de transición entre la niñez y la adultez.

## CARACTERÍSTICAS PARA TOMAR EN CUENTA EN ADOLESCENTES

- Alimentación
- Trabajo
- Ejercicio
- Enfermedades concomitantes



## TRASTORNOS ENDOCRINOS DE LA PUBERTAD EN LA NIÑA Y ADOLESCENTE.

### Pubertad precoz.

aparición de caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en la niña, ya sea botón mamario o vello púbico asociado a un aumento de la velocidad de crecimiento.

Los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas (aGnRH): son el tratamiento de elección en la pubertad precoz central.



### Pubertad retrasada.

falla en el inicio y progresión de la maduración sexual la pubertad retrasada puede ser fisiológica en un gran número de casos y a menudo está en el contexto de una talla baja y un retraso constitucional del crecimiento y desarrollo

El tratamiento varía según el origen del problema, pero puede incluir 2: En los varones, inyecciones, parches cutáneos o geles con testosterona. En las niñas, estrógeno y/o progesterona en píldoras o en parches cutáneos.




# PSICOFARMACOS

El uso de psicofármacos han incrementado durante los últimos años de forma alarmante.



Según la OMS a habido un incremento entre los años 2005 y 2012.

Son muchas las estadísticas que alertan del preocupante aumento en el consumo de fármacos ansiolíticos y antidepresivos.



Psicofármacos autorizados más utilizados en niños y adolescentes son:

- Antidepresivos
- Neurolepticos
- Benzodiazepinas
- Psicoestimulantes



# PROBLEMAS ALIMENTICIOS

## BULIMIA



La bulimia nerviosa, comúnmente denominada bulimia, es un trastorno alimentario grave y potencialmente fatal.

Los antidepresivos pueden ayudar a aliviar los síntomas de la bulimia cuando se los usa junto con psicoterapia.

- terapia cognitivo-conductual
- tratamiento basado en la familia
- psicoterapia interpersonal



El único antidepresivo específicamente aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para tratar la bulimia es la fluoxetina (Prozac)

## ANOREXIA



Trastorno de la alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada del peso.

- Terapia familiar
- Terapia individual

No hay medicamentos aprobados para tratar la anorexia porque ninguno ha demostrado funcionar bien.

# BIBLIOGRAFIA

- <https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/puberty/informacion/tratamientos#:~:text=En%20la%20pubertad%20tard%C3%ADa%20o,p%C3%ADdoras%20o%20en%20parches%20cut%C3%A1neos>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/anorexia-nervosa/diagnosis-treatment/drc-20353597>
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bulimia/diagnosis-treatment/drc-20353621>

