



## **Cuadro sinóptico**

*Nombre del Alumno: nohemi Judith escobar ramos*

*Nombre del tema: fármacos*

*Parcial: 1°*

*Nombre de la Materia: farmacología*

*Nombre del profesor: Dr. Manuel Eduardo López Gómez*

*Nombre de la Licenciatura: medicina humana*

*Cuatrimestre: 3°*

**Fármacos vistos en clase**



**Primir.**

Acidificante/antiséptico de orina y antiespasmódico auxiliar en el tratamiento de infecciones de las vías urinarias tales como, pielitis, pielonefritis, uretritis, uretrotrigonitos

**Dosis**

**Adulto**

200 mg cada 8 hrs

**Niño**

100 mg cada 8 horas a criterio del médico

**Presentación.**

Tabletas: 100mg

**Efectos adversos**

Cefalea, mareos, confusión; coloración amarillenta de la piel u ojos, coloración de la piel púrpura), sarpullido;

**Nifrofurantoina.**

Bactericida, concentraciones terapéuticas urinarias cruza la barrera placentaria y hematoencefalica

**Dosis**

**Adulto**

50 a 100 mg cd 4 veces dia

**Niño**

50 mg 4 veces dia

**Presentación**

Caja: 40 capsulas 100mg  
Caja: 40 capsulas 50 mg

**Efectos adversos**

Cefalea, trastornos gastrointestinales, dispepsia, náuseas y vómitos

**Ceftriaxona.**

Tratamiento de las infecciones moderadas o graves, causadas por aerobios Gram positivos-Gram negativos.

**Dosis**

**Adulto**

1 a 2 gramos al dia

**Niño.**

50 a 70 mg/kg/día

**Presentación.**

Caja: frasco polvo y ampolleta: 1g/13.5g/ml  
Cja: frasco, polvo y ampolleta 500mg

**Efectos adversos.**

piel pálida, debilidad o falta de aliento cuando hace ejercicio.  
Diarrea hinchazón del rostro o las manos ,náuseas y vomito

**Ciprofloxacino**

Infecciones de piel y tejidos blandos, neumonías, infecciones del tracto urinario

**Dosis**

**Adulto**

500 a 750 mg

**Niño**

No se recomienda

**Presentación**

Tabletas 500 mg

**Efectos adversos**

- Náusea, vómitos, dolor de estómago. acidez estomacal. Secreción vaginal.

**Medicamentos vistos.**

**Doxiciclina**

Infecciones de las vías respiratorias, infecciones del aparato urogenital, intestinales e infecciones dermatológicas

**Dosis**

- Adulto** 100 mg / día o 200 mg
- Niño.** [ ]

**Presentación.**

Caja. Tabs: 100mg  
Caja: tabs: 50mg

**Efectos adversos**

Diarrea, nauseas, vómitos  
malestar estomacal

**Clotrimazol.**

Agente antimicótico de amplio aspecto, utilizado en el tratamiento de infecciones dérmicas micosis

**Adulto.**

1 a 2 semanas

**Niño.**

\*\*\*\*\*

**Presentación**

Tópico crema 2%

**Efectos adversos.**

sarpullido, urticaria,  
dolor de estómago,  
fiebre, escalofríos

**Clotrimazol  
Óvulos**

Agente antimicótico de amplio aspecto, utilizado en el tratamiento de infecciones dérmicas micosis

**Adulto**

- Ovulo de 500 mg
- Ovulo de 200 mg

**Presentación.**

1 caja, 10 óvulos,  
500 mg  
2 caja, 50 óvulos,  
500 mg

**Efectos adversos.**

sarpullido, · urticaria, · dolor de estómago, · fiebre, · escalofríos, · náuseas, · vómitos, · olor fétido del flujo vaginal.

