



# SUPER NOTA

NOMBRE DEL ALUMNO: HERNANDEZ GOMEZ LILIANA  
GUADALUPE

NOMBRE DEL TEMA: LEISHMANIASIS

PARCIAL: 2

NOMBRE DE LA MATERIA: SALUD PUBLICA 1

NOMBRE DEL PROFESOR: DRA. MARTINEZ LOPEZ  
KATIA PAOLA

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA HUMANA  
SEMESTRE: 1

# Leishmaniasis




## ¿Qué es?

Es una de las enfermedades más importantes transmitida por vectores, en humanos. Esta parasitosis puede ser causada por muchas especies de *Leishmania*, la mayoría de las cuales son zoonóticas, producen úlceras cutáneas y nódulos


## Etiología

La leishmaniasis es producida por la infección de varias especies de *Leishmania*, un parásito protozoario de la familia Trypanosomatidae (orden Kinetoplastida).



## Transmisión

En general, *Leishmania* spp. se transmite indirectamente entre huéspedes por medio de moscas de arena del género *Phlebotomus* y *Lutzomyia*, que son vectores biológicos



## Epidemiología

Los humanos y los animales domésticos son huéspedes accidentales para muchas especies de *Leishmania*, que se mantienen en ciclos entre animales silvestres y moscas de arena. La *L. infantum*, *L. peruviana* y posiblemente otras especies pueden permanecer en perros, aumentando el riesgo de transmisión a las personas.



## Período de incubación

Para leishmaniasis cutánea, puede ser tan breve como de 1 a 2 semanas o tan prolongado como de varios meses.

Para leishmaniasis visceral es de 10 días a varios años; la mayoría de los casos se hacen evidentes en 2 a 6 meses.



## Signos clínicos

En los humanos se observan dos formas de leishmaniasis: cutánea y visceral. Algunos infecciones permanecen asintomáticas



L. Visceral



L. Cutánea



## Leishmaniasis cutánea

La leishmaniasis generalmente involucra solo la piel y puede estar caracterizada por la presencia desde una a docena de lesiones. Según la especie de *Leishmania*, se pueden observar úlceras, nódulos lisos, placas planas o lesiones hiperqueratósicas similares a las verrugas. Las lesiones iniciales que aparecen en la piel que estuvo expuesta a moscas de arena generalmente son pápulas.

## Leishmaniasis visceral

La leishmaniasis visceral es generalmente una enfermedad insidiosa y crónica entre los habitantes de áreas endémicas. Los síntomas más comunes de leishmaniasis visceral son fiebre ondulante prolongada, pérdida de peso, disminución del apetito, signos de anemia y distensión abdominal con esplenomegalia y hepatomegalia.

## Tratamiento

La leishmaniasis visceral o cutánea generalmente se puede curar en individuos inmunocompetentes. Se pueden utilizar antimoniales pentavalentes cuando los parásitos son sensibles a estas drogas, aunque la resistencia es un problema importante en algunas áreas. También se pueden utilizar otras drogas como alupurinol, anfotericina B o anfotericina liposomal B y miltefosina.

