

Nombre del Alumno: Debora Mishel Trujillo Liévano

Nombre del tema: historia de la enfermedad

Parcial : I

■ Nombre de la Materia: salud publica

Nombre del profesor: Katia Paola Ballinas Gómez/

Nombre de la Licenciatura: medicina

Cuatrimestre: I

LEISHMANIASIS

Qué es

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria diseminada por la picadura de un mosquito llamado flebótomo.

Existen varias formas distintas de leishmaniasis.

Las más comunes son:

- ❖ la cutánea
- ❖ la visceral.



tipos

cutánea y visceral



periodo prepatogenico

Esta fase se da previo al inicio de la enfermedad, el ser vivo no presenta manifestaciones clínicas, ni cambios celulares, tisulares u orgánicos. Está conformado por las condiciones del huésped, el agente y el medio ambiente.



periodo patogenico

En las áreas endémicas, entre el 30 y 100% de las personas infectadas no presenta síntomas.

El periodo de incubación promedio es de 2 a 4 meses, con un rango entre 3 semanas y más de dos años



etiología

La mayor parte de las leishmaniasis son zoonosis parasitarias en las que diferentes especies de animales actúan como reservorios del parásito. En su ciclo biológico se incluyen unos mosquitos, los flebótomos, también conocidos con el nombre de beatillas o moscas de los arenales.



bibliografias

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis#:~:text=Leishmaniasis%20cut%C3%A1nea%20es%20la%20forma,Oriente%20Medio%20y%20Asia>