

13 / 09 / 22

Sanchez Lopez Jesus Ivan

## Caso clínico 1

1. ¿Qué barreras principales identificas para la atención de esta paciente? Género, Tradicionismo, Cultural, No habla español, menor de edad, No hay control, No hay ~~control~~ traductor de la lengua que hablan los pacientes.

2. ¿Cómo explicarías, que es necesario enviarla a seguridad nivel de atención? Explicarle que el ~~be~~ embarazo no tiene control, la mamá viene en mal estado, y debido al estado de la madre el producto está en peligro por que no hay suficiente espacio en la panza o Vientre, y que ambos llegan con un nivel de desnutrición grave. Y el bebe viene ~~sentado~~ y debido al estado es posible que sea necesario una cesaria.

3. Familiar No acepta ~~hacerlo~~. ¿Qué harías? Decirle que si no acepta, la mamá y el producto falleceran.



## Caso clínico 2

1 ¿Qué barreras principales identificas para la atención de estos pacientes? Atención prioritaria.

2 ¿Cómo explicarías, que es necesario enviar al segundo nivel de atención a los 3 pacientes con mayor riesgo? Explicar que los otros 3 necesitan atención de urgencia y no puedo chequearlos ahí y el resto es de riesgo menor y que puedo tratarlos y estabilizarlos.

3 ¿Qué procedimientos realizarías para la valoración y clasificación de necesidad de atención de todos los pacientes?

Triage

## Caso clínico 3

1 ¿Qué barreras principales identificas para la atención de estos pacientes? Temor, angustia

2 ¿Cómo explicarías, que es necesario ingresarla para salvaguardar su vida? Desidera que hay que controlar o estabilizarla o sufrirá una muerte dolorosa

3 ¿Qué alternativa propones? Explicarle a sus familiares que es necesario la intervención, para que pueda sobre vivir

¿Qué harías? De sírles a los familiares que firmen un documento donde diga que se niegan a intervención.

¿Mergarías la atención después de haber sido rechazada? No