



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LIC. EN MEDICINA HUMANA
QUINTO SEMESTRE**

PRIMER PARCIAL

**PSIQUIATRÍA
CUADRO SINÓPTICO
CLASIFICACIÓN EN PSIQUIATRÍA**

DOCENTE:

Dr. Julio Andrés Ballinas

ALUMNA:

Angélica Montserrat Mendoza Santos

San Cristóbal de las Casas. Chiapas



CLASIFICACIÓN EN PSIQUIATRÍA

Tienen varias funciones: diferenciar entre distintos diagnósticos psiquiátricos con el objetivo de que los médicos puedan ofrecer el tratamiento más eficaz; proporcionar un lenguaje común entre profesionales de la salud, y explorar las causas aún desconocidas de numerosos trastornos mentales.

Trastorno del neurodesarrollo
Estos trastornos suelen diagnosticarse por primera vez en la lactancia, la niñez o la adolescencia

Trastorno de la comunicación
Trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o tartamudeo, trastorno de la comunicación social o pragmático

Trastornos del espectro autista: El espectro autista comprende un conjunto de comportamientos que se caracterizan por dificultades graves en numerosas áreas del desarrollo, como reciprocidad social, comunicación y patrones de comportamiento o actividades de tipo restrictivo o repetitivo, incluyendo el habla.

TDAH: La característica central de la enfermedad es la falta de atención persistente, junto con hiperactividad, impulsividad o ambas

Trastornos específicos del aprendizaje: Son déficits en la maduración del desarrollo que se asocian con dificultades para adquirir las habilidades específicas de la lectura

Esquizofrenia:
La esquizofrenia es un trastorno crónico en el que generalmente existen alucinaciones o delirios acusados.

Trastorno psicótico breve. El trastorno psicótico breve requiere la presencia de delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y comportamiento

Trastorno esquizofreniforme. El trastorno esquizofreniforme se caracteriza por los mismos síntomas de la fase activa de la esquizofrenia

Trastorno esquizoafectivo.
Se caracteriza por los mismos síntomas de la fase activa que se observan en la esquizofrenia, así como por la presencia de un síndrome maníaco o depresivo

Trastorno psicótico debido a otra afección médica.
Se caracteriza por alucinaciones o delirios que son consecuencia directa de una alteración médica

Trastorno bipolar I.
La característica imprescindible para el diagnóstico de trastorno bipolar I son los antecedentes de un episodio maníaco o de un episodio mixto maníaco-depresivo.

Trastorno bipolar II: El trastorno bipolar II se caracteriza por antecedentes de episodios hipomaniacos y de depresión mayor

Trastorno ciclotímico: El trastorno ciclotímico es el equivalente bipolar del trastorno distímico.

Trastorno bipolar debido a otra afección médica: Se diagnostica cuando existen pruebas de que una alteración importante del estado de ánimo es consecuencia directa de una enfermedad médica general

Trastorno bipolar inducido por sustancias/ medicamentos: Se diagnostica cuando la causa de la alteración del estado de ánimo es la intoxicación por una sustancia

Trastorno depresivo mayor: La característica obligada del trastorno de depresión mayor es un estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer por las actividades habituales

Trastorno disfórico premenstrual: Aparece aproximadamente 1 semana antes de la menstruación y se caracteriza por irritabilidad, labilidad emocional, cefalea y ansiedad o depresión, que remiten cuando acaba el ciclo menstrual.

Agorafobia: La agorafobia es una consecuencia frecuente del trastorno de pánico, aunque puede ocurrir en ausencia de éste

Trastorno depresivo debido a otra afección médica: Es un estado secundario a una enfermedad

Trastorno de pánico: La crisis de angustia o ataque de pánico se caracteriza por sentimientos de miedo o terror intenso que aparecen de pronto, sin un motivo aparente, en situaciones en las que no hay nada que temer.



Trastorno de duelo complejo persistente: Supone una pena crónica y persistente que se caracteriza por amargura, enfado o sentimientos ambivalentes hacia alguien muerto

Amnesia disociativa: La amnesia disociativa se caracteriza por el olvido de información personal importante de naturaleza generalmente traumática