



**Nombre del alumno: MARIO DE JESUS SANTOS HERRERA**

**Nombre del profesor: MANUEL EDUARDO LOPEZ**

**Licenciatura: MEDICINA HUMANA**

**Materia: medicina del trabajo**

**Nombre del trabajo: mapas conceptual**

**San Cristóbal De Las Casa, Chiapas a 18 de diciembre del 2022**

Un estudio de la Universidad de Pennsylvania, publicado en el American Journal of Public Health, las personas que padecen trastornos de salud mental tienen hasta cuatro veces más probabilidades de contraer VIH que la población en general.

Salud mental.

Transfusión de sangre.

Cuando las personas se someten a este tipo de práctica sin garantías de seguridad, es decir, con material no esterilizado.

# factor de riesgo del VIH

Sexo sin protección.

La OMS detalla que practicar relaciones sexuales anales o vaginales sin protección es un factor de riesgo.

Compartir objetos contaminados.

El préstamo de agujas, jeringas y drogas son grandes factores de riesgo para el VIH.

Infecciones de transmisión sexual.

Las personas que padecen sífilis, herpes, clamidia, gonorrea o vaginosis bacteriana son más propensas a contraer VIH.

Algunos estudios de investigación sugieren que los anticonceptivos orales, que son las píldoras anticonceptivas, pueden estar asociados a un aumento en el riesgo del cáncer de cuello uterino. Sin embargo, una mayor investigación es necesaria para entender cómo se vincula el uso de anticonceptivos orales con el desarrollo de cáncer de cuello uterino.

El factor de riesgo más importante del cáncer de cuello uterino es la infección por HPV. Las investigaciones indican que la infección por este virus es un factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino. Mantener actividades sexuales con una persona que tiene el HPV es la forma más frecuente de contraer el HPV. Existen más de 100 tipos diferentes de HPV, y no todos están vinculados al cáncer.

ANTICONCEPTIVOS  
ORALES.

INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL  
PAPILOMA HUMANO (HUMAN  
PAPILLOMAVIRUS, HPV).

Las niñas menores de 15 años de edad rara vez desarrollan cáncer de cuello uterino. El riesgo aumenta entre el final de la adolescencia y mediados de los 30 años de edad. Las mujeres mayores de 40 años de edad siguen en riesgo y deben continuar sometiéndose con regularidad a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino, que incluyen pruebas de Papanicolaou y de HPV.

Las mujeres con un sistema inmunitario disminuido corren un mayor riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Un sistema inmunitario disminuido puede deberse a la inmunodepresión producida por medicamentos corticosteroides, trasplantes de órganos, tratamientos para otros tipos de cáncer o por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH; en inglés), que es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Cuando una mujer tiene VIH, su sistema inmunitario es menos capaz de combatir el cáncer temprano.

EDAD.

FACTORES DE RIESGO  
DE

Ca Cu

DEFICIENCIA DEL SISTEMA  
INMUNITARIO.

TABAQUISMO.

HERPES.

Las mujeres que fuman tienen dos veces más riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino que las mujeres que no fuman.

Las mujeres que tienen herpes genital presentan un riesgo mayor de desarrollar cáncer de cuello uterino.



# MEDICINA INTERNA



## 1 PESO

mientras mas tejido graso tengas, mas resistentes serán tus células a la insulina

## 2 INACTIVIDAD O SEDENTARISMO

mientras menos actividad realices mayor será tu riesgo

## 3 ANTECEDENTES FAMILIARES

el riesgo es incrementa si alguno de los padres o hermanos tiene diabetes tipo 2

## 4 RAZA O GRUPO ÉTNICO

las personas negras hispanas, los indigenas estadounidenses y asiatico-americanas, corren un mayor riesgo

## 5 EDAD

el riesgo aumenta con la edad

## 6 DIABETES GESTACIONAL

si desarrollaste diabetes gestacional cuando estabas embarazada, aumenta tu riesgo de desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2. Si distes a luz un bebe de mas de 4 Kg, corres el riesgo de tener diabetes tipo 2.

## 7 SINDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO.

para las mujeres, tener ovario poliquístico, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes

## 8 PRESION ARTERIAL ALTA.

una presión arterial de más 140/90 mmHg implica un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2

## 9 NIVELES ANORMALES DE COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS

los niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad o de colesterol bueno, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 será mayor

## 10 OTROS FACTORES

- elevada ingesta alcohólica
- hipogonadismo masculino
- glucemia alterada en ayunas

## factores de riesgo relacionados con estilo de vida

- alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra.
- dieta rica en grasas tanto animales como ácidos grasos trans.
- obesidad, principalmente en la posmenopausia.
- sedentarismo
- consumo de alcohol mayor de 15 g/día.
- tabaquismo.

# factores de riesgo del Cancer de mama

## Biologicos

- sexo femenino
- envejecimiento: mayor edad mayor riesgo.
- antecedentes heredofamiliares.
- vida menstrual mayor a 40 años. y menarca antes de los 12 años y menopausia después de los 52 años.
- densidad mamaria
- ser portador de los genes BRCA1 o RBCA2

## factores de riesgo relacionados con los antecedentes reproductivos

- Nuliparidad
- primer embarazo a termino después de los 30 años de edad.
- terapia hormonal en la perimenopausia o posmenopausia por mas de cinco años.

## latrogenos o ambientales

- exposición a radiaciones ionizantes, principalmente durante el desarrollo o crecimiento.
- tratamiento con radioterapia