

# ANTIDEPRESIVOS

La depresión es un trastorno mental caracterizado por cambios en el humor, en la conducta sentimientos de inutilidad, culpa y desesperanza.

↓  
Depresión

↓  
acompañada

↓  
de

↓  
VARIOS SINTOMAS  
CONCOMITANTES.

↓  
Incluidos

↓  
LOS PROBLEMAS  
DEL SUEÑO Y DE  
LA COMIDA.

↓  
Trastorno  
depresivo

↓  
denominado

↓  
TRASTORNO DEL  
HUMOR

↓  
Se caracteriza

↓  
POR UNA ALTERACIÓN  
SIGNIFICATIVA DEL  
ESTADO DE ANIMO

↓  
Clases de los  
medicamentos

↓  
son

↓  
ANTIDEPRESIVOS  
HETEROCICLICOS  
INHIBIDORES SE-  
LECTIVOS DE LA  
RECAPTACIÓN DE  
SEROTONINA  
(ISRS)  
INHIBIDORES  
DE LA RECAPTACIÓN DE NORA-  
ADRENALINA  
SEROTONINA

# TRICICLICOS y TETRACICLOS

SON INHIBIDORES DE LA RECAPTACION DE NEUROTRANSMISORES Y ALGUNOS SON CAPACES DE BLOQUEAR LA NORADRENALINA.

Medicamentos incluidos

AMITRIPTILINA

IMIPRAMINA

NORTRIPTILINA

DESMIPRAMINA

CLOMIPRAMINA

AMOXAPINA

AMITRIPTILINA

Es una

AMINA TERCIARIA y su mecanismo de accion es la inhibicion de serotonina y noradrenalina.

se administra por

VIA ORAL

ESTREÑIMIENTO

SECUREZ DE BOCA

Indicado en

DEPRESION psicologica y CRONICA.

DEPRESION EN PACIENTES HOSPITALIZADOS.

DOSES

25mg 3/dia.

Reduccion

# IMIPRAMINA

ES EL FÁRMACO MÁS ESTUDIADO EN EL TRATAMIENTO CRÓNICO DE LAS DEPRESIONES RECURRENTES. BLOQUEA NORADRENAJINA Y SEROTONINA.

Se administra por

VIA ORAL

Absorbido en el

TRACTO GASTRO-INTESTINAL.

Se utiliza para

ALIVIA LOS SINTOMAS DE LA DEPRESIÓN.

Útil en

LA ENORESIS EN NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS.

20-40 mg/día

Dosis

25 mg 3/día

NIÑOS 10-25 mg/día.

Reacciones son

BOCA SECA

NAUSEAS



# ISRS

INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (ISRS)

↓  
**FLUOXETINA**

↓  
REPRESENTANTE DEL GRUPO.

↓  
Derivado de la

↓  
**ANFETAMINA**

↓  
Inhibe la

↓  
RECAPTACIÓN DE SEROTONINA EN LAS TERMINACIONES NERVIOSAS

↓  
Se administra

↓  
**VIA ORAL**

↓  
**Dosis**

↓  
**20-80 mg/día**

↓  
Indicado en

↓  
DEPRESIÓN  
TRASTORNO DE AUMENTACIÓN

↓  
TRASTORNO DE OBSESIÓN COMPULSIVO

↓  
**Reacciones**

↓  
DIFUNCIÓN SEXUAL  
CEFALEA, INSOMIO  
SOPINOCENCIA, FATIGA, NAUSEAS.

# PAROXETINA

↓  
DERIVADOS DE LA  
FENILPiperIDINA

↓  
Es un

↓  
POTENTE ISRS EN  
LAS TERMINACIONES NERVIOSAS.

↓  
Se administra  
por

↓  
VIA ORAL

↓  
Indicado  
en

- \* CONTROL DE LA DEPRESION.
- \* FOBIA SOCIAL
- \* TRANSTORNO OBSESIVO COMPULSIVO, POR ANXIETA
- \* ANSIEDAD GENERALIZADA Y
- \* POSTRAUMATICO.

↓  
Dosis

↓  
20 mg 1/DIA

↓  
Reacciones

↓  
NAUSEAS  
SOPORIFENCIA  
EGYACUACION RETARDA  
MAREOS.

↓  
Contraindicar

↓  
EMBARAZO y  
LACTANCIA

# INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACION DE SEROTONINA y NORADRENALINA

↓  
**VELANFAXINA**

↓  
Es el

↓  
PRIMER FARMACO

↓  
Derivado

↓  
DE LA FENICETIAMINA

↓  
No está

↓  
RECACIONADA CON OTROS  
ANTI DEPRESIVOS.

→ Es un

↓  
POTENTE INHIBIDOR  
DE LA RECAPTURA  
DE SEROTONINA.

↓  
Su potencial

↓  
PARA INHIBIR LA  
RECAPTACION DE  
SEROTONINA ES  
5-3 MAS QUE PA-  
RA LA NORADREN-  
ALINA.

↓  
Se administra  
por

↓  
VIA ORAL!

↓  
Indicado  
en


- ↓
- \* TRASTORNO DE ANSIEDAD
  - \* ANSIEDAD GENERALIZADA
  - \* TRASTORNO DE PÁNICO
  - \* TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCIÓN EN NIÑOS

↓  
DOSIS.


↓  
75mg/día



# MILNACIPRAM



# INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE NORADRENAUNA.





# ANSIOLITICOS

CONSTITUYE UN GRUPO DE MEDICAMENTOS QUE DISTINGUE LA ANSIEDAD LA TENSION EMOCIONAL, EL ESTRES Y LOS ESTADOS DE ANGUSTIA.

↓  
Ansiedad

↓  
Ej un

↓  
ESTADO DEL ORGANISMO DE SUSTUACION DE ACERTACARIA CON RESPECTO A UNA AMENAZA A SU INTEGRIDAD FISICA.

↓  
Transtornos

- ↓
- \* ANSIEDAD GENERALIZADA
  - \* OBSESIVO-COMPULSIVO
  - \* ANGUSTIA
  - \* ESTRES POSTRAUMATICO
  - \* ANSIEDAD SOCIAL.

↓  
Síntomas

- ↓
- \* SUDACION
  - \* TAQUICARDIA
  - \* MIEDO
  - \* NERVIOSISMO
  - \* DIFICULTAD PARA CONCENTRARSE.

↓  
Tratamiento

↓  
ANSIOLITICOS, PSICOTERAPIA  
REDUCCION DE ESTRES.

# BENZODIAZEPINAS

CONSTITUYEN LOS FARMACOS DE ELECCIÓN PARA TRATAR LA ANSIEDAD. TODAS COMPARTEN PROPIEDADES ANSIOLÍTICAS, HIPNÓTICAS, ANTICÓNICULSAS Y MORRELAJANTES.

Benzodiazepinas  
acción de prolongada

VIDA MEDIA DE  
24 HRS O MÁS.

Medicamentos

- \* CLONAZEPAM
- \* CLOBAZEPAM
- \* CLORAZEPATO
- \* DIAZEPAM.

Benzodiazepina  
acción de intermedia

VIDA MEDIA QUE  
OSCALA ENTRE 5-24 HRS.

Farmacos

- \* ALPRAZOLAM
- \* LORAZEPAM
- \* BROMAZEPAM

Benzodiazepinas  
acción de corta

VIDA MEDIA PLENA  
DE 5 HRS.

Farmacos

- \* TRIAZOLAM
- \* MIDAZOLAM
- \* OXAZEPAM.

# ANSIOLITICOS NO BENZODIAZEPINICOS.

(LAS AZASPIRONAS SON UN NUEVO GRUPO QUIMICO CON UN PERFIL DISTINTO DEL DE LAS BENZODIAZEPINAS.)

