

# Tipos de dolor

## CUADRO COMPARATIVO

Características	Tipos de dolor			
	Somático	Visceral	Neuropático	Psicogénico
Fibras predominantes	Miélnicas A (Aα Aδ)	Amiélnicas o C		
Estructuras lesionadas	Piel, mucosas, ligamentos, huesos.	Visceras.	Piel, músculos y huesos.	Carecen de sustrato estructural.
Cualidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agudo y punzante.</li> <li>• Comienzo y finalización rápidos.</li> </ul>	Urente, vago y tardío.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El dolor de la piel puede describirse como urente, coratnte, punzante o transfixiante.</li> <li>• Permanente o intermitente.</li> <li>• Puede sufrir refuerzos paroxísticos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se descubren alteraciones estructurales.</li> <li>• Se pueden explicar por un descenso del umbral perceptivo ante estímulos fisiológicos.</li> </ul>
Límites	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Precisos.</li> <li>• Bien localizado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprecisos.</li> <li>• Mal localizado, en general referido a la línea media.</li> </ul>	Topografía regional que no siempre respeta la distribución anatómica.	
Mecanismos generadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traumatismos.</li> <li>• Temperaturas extremas.</li> <li>• Inflamación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distención.</li> <li>• Isquemia.</li> <li>• Inflamación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe a la lesión de vías nerviosas.</li> </ul>	Se relacionan con ciertas perturbaciones: neurosis, hipocondría, trastornos somatoformes.