



**CLASIFICACION**

- 1.- Poliomielitis no paralitica
- 2.- Poliomielitis paralitica
- 3.- Poliomielitis paralitica bulbar
- 4.- Sindrome pospoliomielitis

**POLIOMIELITIS**

**INFECCION POR POLIOVIRUS**

Es altamente contagiosa, cuya evolucion natural varia desde una infeccion asintomatica o manifestaciones clinicas inespecificas de tipo respiratorio o intestinal, una meningitis linfocitaria, hasta una forma paralitica con graves secuelas motoras.

Es una enfermedad producida por el poliovirus, del que se han descrito tres serotipos

**SERO TIPOS**

- Serotipo 1
- Serotipo 2
- Serotipo 3

**CUADRO CLINICO**

Periodo de incubacion entre 7-14 dias desde el momento del contagio hasta el inicio de las manifestaciones clinicas

**MANIFESTACIONES CLINICAS**

- FIEBRE
- MALESTAR GENERAL
- CEFALEA
- ODINOFAGIA
- DECAIMIENTO
- ANOREXIA
- VOMITOS
- DOLOR ABDOMINAL
- DIARREA
- ESTREÑIMIENTO

**DISTROFIAS MUSCULARES**

**DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE**

De origen genetico ligado al cromosoma X, con afectacion en el gen Xp21

**FISIOPATOLOGIA**

Deficiencia de distrofina ocasionando perdida del tejido muscular o fibrosis del mismo.

**DISTROFIA MUSCULAR DE BECKER**

Enfermedad Genetica ligado al cromosma X. Su transmicion es de tipo recesivo. Gen afectado DYS, encargado de codificar la distrofina

**DIAGNOSTICO**

ESTOS SON

Estudios de Western Blot

**CUADRO CLINICO**

- 1.- Perdida muscular del area pelvica, piernas y hombros
- 2.- Las pantorrillas de apariencia musculosa
- 3.- Espasmos musculares en la actividad fisica
- 4.- Trastorno de la marcha
- 5.- Deformidades oseas
- 6.- Cardiomiopatia
- 7.- Marcha de pato
- 8.-

**MANIFESTACIONES CLINICAS**

ESTAS SON

- 1.- Marcha de puntilla
- 2.- Hiperlordosis lumbar
- 3.- Signo de cower
- 4.- Distrofia unilateral de los musculos de la pierna
- 5.- Debilidad de los musculos del cuello.