



ALUMNA: JOHANA ALEJANDRA MUÑOZ LAY

DOCENTE: PAULINA MARIBEL JUAREZ RODAS

MATERIA: BIOLOGIA DEL DESARROLLO

DOCUMENTO: PRACTICA 6 Y 7

LICENCIATURA: MEDICINA HUMANA

PRIMER SEMESTRE

CUARTO PARCIAL

CUESTIONARIO DE PRACTICA Y DIBUJO

QUESTIONARIO

¿Edad fetal en que el trofoblasto se caracteriza por vellosidades secundarias y terciarias?

La vellosidad terciaria aparece después del día 21 de la gestación, presenta ramificaciones y está formada por columnas CT, ST.


¿Cuáles son los componentes de la placenta?

La placenta está formada por componentes fetales: mesenquima, epitelio del corion y endotelio capilar.


Componentes maternos: Tejido conectivo, mucosa uterina y endotelio capilar.

3. ¿Es el corion que localiza en el polo c...

4. ¿Es la estructura materna que da lugar a la formación de la placenta?
basal



Cara
materno



Cara
Fetal

La practica se llevo a cabo en el laboratorio de nuestra institucion con el fin de saber reconocer las estructuras que contiene la placenta en conjunto con el cordon umbilica.

