



FÁRMACOS



ANTIPARASITARIOS



Albendazol

Presentacion: tabletas de 200 y 400 mg y en suspensión oral de 200 y 400 mg/ml.

via oral

Dosis: 400 mg como dosis única, pediátrica: 15 mg/kg/día

Reacciones adversas: diarrea y cólicos abdominales, anorexia

MEBENDAZOL

Presentacion: tabletas masticables de 100 y 500 mg y suspensión or via oral

Dosis: caso de ascariasis es de 100 mg dos veces al día, en la mañana y en la noche durante tres días consecutivos

Reacciones adversas: Algunas veces produce dolor abdominal transitorio y diarrea



METRONIDAZOL

Presentacion: tabletas de 500mg, ampollitas de 500 mg y óvulos de 250 mg Crema y gel

oral, intravenoso

Dosis: La dosis que se utiliza es de 500 mg tres veces al día durante 5 a 10 días.

Reacciones adversas: náuseas, vómito, anorexia, diarrea, dolor epigástrico, mareo



DIYODOHIDROXIQUINOLEINA

Presentacion: tabletas de 650 mg. Otras presentaciones: suspensión. oral

Dosis: La dosis que se administra es de 650 mg tres veces al día durante 20 días.

Reacciones adversas: gastrointestinales, fiebre, erupción cutánea, crecimiento de la glándula tiroides, color amarillo de piel y de cabello



Tinidazol

Presentacion: tabletas de 500 mg..

oral

Dosis: 500 mg tres veces al día durante tres días

Reacciones adversas: gastrointestinales: náuseas, vómito, dolor abdomina





FÁRMACOS ANTIPARASITARIOS



Praziquantel

Presentacion: tabletas de 150 y 600 mg oral

Dosis: 60 mg/kg/día en tres dosis divididas por un día

Reacciones adversas: Náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, fiebre, somnolencia, anorexia

PIRANTEL

Presentacion: tabletas de 100, 125 y 250 mg. suspensión oral

Dosis: • La dosis recomendable es de 11 mg/kg hasta 1 g como dosis única

Reacciones adversas: dolor abdominal transitorio, náuseas, vómito, diarrea, vértigo, cefalea, fiebre y mareos



CLOROQUINA

Presentacion: tabletas de 150 mg.

Dosis: •Primera dosis: 600 mg inicial, después 300 mg a las 6, 24, 48 horas. Segunda dosis: 300 mg una vez al día. Tercera dosis: 300 mg una vez al día.

Reacciones adversas: prurito, cefalea, hipotensión arterial, trastornos visuales, caída del cabello y cardiomegalia



MEFLOQUINA

Presentacion: • tabletas de 250 mg

Dosis: dosis de 100 mg, dos veces al día durante el primer día, seguida de 50 a 75 mg diarios durante 3 a 6 semanas.

Reacciones adversas: anorexia y vómito. A dosis altas produce anemia megaloblástica y leucopenia



PRIMETAMINA

Presentacion: tabletas de 25 mg.

Dosis: dosis de 100 mg, dos veces al día durante el primer día, seguida de 50 a 75 mg diarios durante 3 a 6 semanas

Reacciones adversas: anorexia y vómito. • A dosis altas produce anemia megaloblástica y leucopenia

