

NOMBRE	PRESENTACION	VIA DE ADMINISTRACION	DOSIS peditaricas y adultos	REAACIONES ADVERAS
Albendazol	<ul style="list-style-type: none"> tabletas de 200 y 400 mg y en suspensión oral de 200 y 400 mg/ml. 	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> 400 mg comodosis única Pediatricas Ascariasis: en niños de 12 meses-2 años, 200 mg (dosis única); en >2 años, 400 mg (dosis única)1 o 100 mg/12 h y 200 mg/12 h, respectivamente. Tricuriasis: 400 mg (dosis única) por 3 días si hay infestación severa. Repetir en 2 semanas. Anquilostomiasis: 400 mg (dosis única) o 200 mg/12 h. 	<ul style="list-style-type: none"> diarrea y cólicos abdominales, anorexia.
Mebendazol	<ul style="list-style-type: none"> tabletas masticables de 100 y 500 mg y suspensión oral 	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> caso de ascariasis es de 100 mg dos veces al día, en la mañana y en la noche durante tres días consecutivos DOSIS PEDIATRICA Enterobiasis: 100 mg dosis única; repetible en 2-3 semanas ya que la reinfección es frecuente. Tratar también a convivientes con el paciente y medidas higiénicas. Trichiuriasis, ascariasis, anquilostomiasis e infecciones mixtas: 100 mg/12 horas 3 días 	<ul style="list-style-type: none"> Algunas veces produce dolor abdominal transitorio y diarrea
Metronidazol	<ul style="list-style-type: none"> Se presenta en tabletas de 500mg, ampolletas de 500 mg y óvulos de 250 mg <p>Crema y gel</p>	ORAL,INTRAVENOSO	<ul style="list-style-type: none"> La dosis que se utiliza es de 500 mg tres veces al día durante 5 a 10 días. DOSIS PEDIATRICA 30 mg/kg/día divididos cada 6 h (máximo: 4 g/día). Vía oral o i.v. 	<ul style="list-style-type: none"> náuseas, vómito, anorexia, diarrea, dolor epigástrico, mareo

Diyodohidroxiquinoleina	<ul style="list-style-type: none"> Se presenta en tabletas de 650 mg. Otras presentaciones: suspensión. 	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> La dosis que se administra es de 650 mg tres veces al día durante 20 días. DOSIS PEDIATRICA Niños de 1 a 9 años: La dosis se calculará a razón de 40 mg de metronidazol y diyodohidroxiquinoleína por kg de peso/día. Distribuida en 3 tomas al día por 10 días. Dosis media: 125 a 250 mg (1 a 2 cucharaditas cada 8 h.). Dosis máxima: 1.25 g/día en 3 tomas. 	<ul style="list-style-type: none"> gastrointestinales, fiebre, erupción cutánea, crecimiento de la glándula tiroides, color amarillo de piel y de cabello
Tinidazol	<ul style="list-style-type: none"> tabletas de 500 mg. 	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> 500 mg tres veces al día durante tres días. DOSIS PEDIATRICA en los pacientes pediátricos mayores de tres años de edad, la dosis recomendada es de 50 mg/kg/ día (hasta 2 g por día) durante 3 días con los alimentos. 	<ul style="list-style-type: none"> gastrointestinales: náuseas, vómito, dolor abdominal
Prazicuantel	<ul style="list-style-type: none"> tabletas de 150 y 600 mg 	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> 60 mg/kg/día en tres dosis divididas por un día. 10- 20 kg/día 	<ul style="list-style-type: none"> Náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, fiebre, somnolencia, anorexia y erupción cutánea son los más comunes

Pirantel	<ul style="list-style-type: none"> • tabletas de 100, 125 y 250 mg. suspensión 	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> • La dosis recomendable es de 11 mg/kg hasta 1 g como dosis única • DOSIS PEDITRICA • 11 mg kg día 	<ul style="list-style-type: none"> • dolor abdominal transitorio, náuseas, vómito, diarrea, vértigo, cefalea, fiebre y mareos.
Cloroquina	<ul style="list-style-type: none"> • tabletas de 150 mg. 	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> • Primera dosis:600 mg inicial,después 300mg a las 6, 24, 48 horas. Segunda dosis: 300 mguna vez al día. Tercera dosis: 300 mg unavez al día DOSIS PEDIATRICA 10 mg/kg/día de cloroquina base en una toma. Seguido de 5 mg/kg/dosis de cloroquina base a las 6 horas, 24 horas y 48 horas. Esquema 2: 25 mg/kg de cloroquina base, repartido en 3 días: primer y segundo día 10 mg/kg/día de cloroquina base en una toma (dosis máxima: 600 mg/dosis) 	<ul style="list-style-type: none"> • prurito, cefalea, hipotensión arterial, trastornos visuales, caída del cabello y cardiomegalia
Mefloquina	<ul style="list-style-type: none"> • tabletas de 250 mg 	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> • 250 mg una vez por Semana DOSIS PEDIATRICA 	<ul style="list-style-type: none"> • vómito, diarrea, dolor abdominal, cefalea, fiebre, erupción cutánea
Pirimetamina	<ul style="list-style-type: none"> • tabletas de 25 mg. 	ORAL	<ul style="list-style-type: none"> • dosis de 100 mg, dos veces al día durante el primer día, seguida de 50 a 75 mg diarios durante 3 a 6 semanas. 	<ul style="list-style-type: none"> • anorexia y vómito. • A dosis altas produce anemia megaloblástica y leucopenia

Primaquina	<ul style="list-style-type: none">• tabletas de 5 y 15 mg.	ORAL	<ul style="list-style-type: none">• La dosis que se administra es de 15 mg/día durante 14 días. Además, se utiliza en pacientes con neumonía por <i>Pneumocystis jiroveci</i> y la dosis recomendada es de 15 a 30	<ul style="list-style-type: none">• metahemoglobinemia, dolor abdominal y la hemólisis
-------------------	--	------	--	--

			mg/ durante días	día 14