



Alexa Avendaño Trujillo

Q. F. B. Huego Nájera Mijangos

TIÑAS

Microbiología y parasitología

2 "A"

TIÑAS

Cabeza

- Las esporas penetran a través del infundíbulo y parasitan el pelo.
- Producidas por *T. Tonsurans* y *M. Canis*.
- Es casi exclusiva de los niños, excepcional en los adultos.

Bigote

- Varones adultos
- *M. Canis* y *T. Tonsurans*
- Predomina la forma inflamatoria
- Pseudofoliculitis y acné

Cara

- Más frecuente en niños
- Placas circulares u ovalo con pápulas o vesículas en la periferia (borda activo), fina descamación y eritema.
- Pitiriasis rosada e impétigo heraldo.

Cuerpo

- Tronco, cuello, extremidades
- *T. rubrum* y *M. Canis*
- Placas ovals o circulares con borde activo
- Prurito

Inguinocrural

- Eccema marginado de hebra.
- *T. rubrum* ocasionalmente por *T. mentragrofites* y *E. floccosum*
- Zonas crurales o cara anterointernas de los muslos, pliegues inguinal, pubis, periné y nalgas.

- **Tiña microspórica:** Pocas zonas afectadas, una sola placa con tendencia a la inflamación.
- **Tiña tricofítica:** Varias placas con pelos cortados en diferentes niveles.