

Nombre del tema:
Mapa conceptual de las tiñas que afectan la cara y cuerpo.

Nombre del alumno:
Lizbet Noelia Estrada Carballo

Materia:
Microbiología y Parasitología

Grado:2
Grupo:A

Docente:
Químico. Hugo Nájera Mijangos

Tiñas que afectan la cara y el cuerpo

Células de la capa externa de la piel

Viven

infección fúngica contagiosa causada por parásitos comunes similares al moho

Etología

Microsporum
Epidermophyton
Tricophyton

Clasificación

Tiña de la piel pilosa

TIÑA DE LA CABEZA

Zonas circulares de pseudoalopecia y es una escama fina de fácil desprendimiento. Penetra en el infundíbulo y parasita el pelo. Dos formas clínicas en tiñas secas o inflamatorias. Más frecuente en niños.

TIÑA DE LA BARBA Y EL BIGOTE.

Infección dermatofítica y predomina en forma inflamatoria (pseudofoliculitis y acné). Producidos por *M. Canis* y *T. Tonsurans*. Y es frecuente en varones adultos.

Tiña de la piel lampiña

TIÑA DE LA CARA.

Placas circulares u ovaladas con papulas o vesículas en la periferia con borde activo, fina descamación y eritema. Más frecuente en niños.

TIÑA EN EL CUERPO.

Placas ovales o circulares con borde activo, se da en cuello, tronco y extremidades. Dx: dermatitis, pitiriasis y eritema anular centrifugo.

TIÑA DE LAS MANOS.

Finas vesículas, bultos rojos y eritema. El contagio es de persona a persona (directo), afecta a las palmas y hay eminencia temar e hipotenar.

TIÑA INGUINOCRURAL.

Placas eritoescamosas y son ovales o circulares con borde activo. Se da en partes o zonas crurales o caras anteriointernas de los muslos, pliegue inguinal, pubis, periné y nalgas. Es dermatitis por contacto o candidiasis sobre agregada.

Tiña de las uñas

Uñas gruesas, frágiles, quebradizas, amarillas o blancas. Frecuente en en día éticos y ancianos. Dx: cultivo, agar sangre

TIÑA DE LOS PIES.

Infección dermatofítica y el pie de atleta es el más común y se da en ambos pies en plantas y pliegues. Dx diferencial: psoriasis palmoplantar y dermatitis por contacto se da más en personas jóvenes