

UNIVERSIDAD DEL SURESTE CAMPUS COMITÁN LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA



CRECIOMIENTO Y DESARROLLO

CUADRO COMPARATIVO TANNER

Docente:

Dr. LOPEZ CASTRO DANIEL.

Alumno: Jorge Alberto Hilerio Gonzalez

Grado: 3 Grupo:A

Comitán de Domínguez Chiapas, 17 de septiembre del 2022.

ESCALA DE TANNER

¿Qué es la escala de tanner?

La escala de Tanner, estados de Tanner o clasificación de madurez sexual, es una valoración de la maduración sexual a través del desarrollo físico de los niños, adolescentes y adultos. describe los cambios físicos observados en genitales, mamas y vello púbico, a lo largo de la pubertad en ambos sexos.


Escala de tanner en Hombres.

| Tanner I | Volumen testicular menor de 1,5 ml. Pene | Edad normalmente |
|------------|--|--------------------|
| | pequeño, de 5 cm o menos. | menor de 10 años. |
| Tanner II | Volumen testicular entre 1,6 y 6 ml. La piel | Edad entre 10 y 14 |
| | del escroto se adelgaza, se enrojece y se | años. |
| | agranda. La longitud del pene sin cambios. | |
| Tanner III | Volumen testicular entre 6 y 12 ml. El | Edad entre 14 y 16 |
| | escroto se agranda aún más. El pene | años. |
| | comienza a alargarse. | |
| Tanner IV | Volumen testicular de entre 12 y 20 ml. El | Edad entre 14 y 16 |
| | escroto se agranda más y se oscurece. El | años. |
| | pene incrementa su longitud, y hay | |
| | diferenciación del glande. | |
| Tanner V | Volumen testicular mayor de 20 ml. Escroto | Edad 18 años o |
| | y pene de adulto. | mayor. |

Escala de tanner en mujeres:

| TANNER I | Sin tejido glandular; la areola sigue los | Edad normalmente |
|------------|--|--------------------------|
| | contornos de la piel del tórax. | menor de 9 años. |
| TANNER II | Botón mamario, con una pequeña zona de tejido | Edad entre 9 y 13 años. |
| | circundante glandular; la areola comienza a | |
| | ensancharse. | |
| TANNER III | La mama comienza a elevarse, y se extiende | Edad entre 13 y 15 años. |
| | más allá de los límites de la areola, que | |
| | continúa aumentando, pero permanece dentro | |
| | del contorno mamario. | |
| TANNER IV | Elevación y aumento de tamaño de los senos; | Edad entre 15 y 17 años. |
| | areola y pezón forman un montículo secundario | |
| | que sobresale del reborde de la mama. | |
| TANNER V | La mama alcanza su tamaño definitivo de | Edad 17 años o mayor. |
| | adulto; la areola vuelve al nivel de la superficie | |
| | mamaria, pero el pezón sigue haciendo | |
| | prominencia. | |

ESCALA DE TANNER MASCULINA



ESCALA DE TANNER FEMENINA

