



Universidad del sureste

campus Comitán

Licenciatura en medicina humana



Tabla escala de Tanner

Crecimiento y desarrollo

Dr. Daniel López Castro

Limberg Emanuel Altuzar López

3° A

17-09-22

INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DEL HOMBRE Y LA MUJER					
ESTADÍO	SEXO	GENITALES	EDAD PROMEDIO	VELLO PÚBLICO	EDAD PROMEDIO
I	HOMBRE	Aspecto infantil	0 a 11 años	Ausente	0 a 11 años
	MUJER	Aspecto infantil	0 a 11 años	Ausente	0 a 11 años
II	HOMBRE	Volumen testicular en 3cc y Enrojecimiento de la piel del escroto.	11 años y 7 meses aprox.	Escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto	13 años y 5 meses aprox.
	MUJER	Areola aumentada de diámetro y pigmentación, la mama y el pezón son elevados formando un montículo	11 años y 6 meses aprox.	Vello escaso distribuido en los labios mayores, fino, liso y poco pigmentado.	11 años y 8 meses aprox.
III	HOMBRE	Aumento progresivo del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo	12 años y 10 meses aprox.	Rizado, grueso, más pigmentación, de mayor cantidad.	13 años y 9 meses aprox.
	MUJER	Desarrollo del pezón, mayor crecimiento, el aspecto asemeja a la mama adulta	12 años y 6mese aprox.	Aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o monte de venus	12 años y 4 meses aprox.
IV	HOMBRE	Aumento de la longitud y circunferencia del pene, desarrollo del glande, escroto aumentado de tamaño y piel del escroto más oscura.	13 años y 7 meses aprox.	Características similares a las anteriores, extensión limitada al pubis o monte de venus.	14 años y 4 meses aprox.
	MUJER	La areola continúa creciendo, formando un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria, así mismo aparecen corpúsculos de Morgani	14 años y 4 meses aprox.	Abundante, características del adulto, pero, limitado al pubis	14 años y 4 meses aprox.

V	HOMBRE	Tamaño y características de un adulto	A partir de los 14 años.	Se extiende hacia la ingle y cicatriz umbilical, adquiriendo características de adulto.	A partir de los 14 años.
	MUJER	Configuración adulta, no hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria estando en un mismo plano.	A partir de los 14 años.	Distribución características del adulto, terminando en forma triangular	A partir de los 14 años.