



**Universidad Del Sureste Medicina Humana
Campus Comitán
Licenciatura en medicina humana**

**Nombre del trabajo:
Estadios de Tanner y desarrollo sexual del varón y de la
mujer.**

**Nombre del alumno:
Carlos Omar Jacob Velázquez**

**Grado: 3
Grupo: A**

Materia: Genética humana

Docente:

Dr. Daniel López Castro

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de septiembre 2022

	Varón		Mujer	
Estadio	Genitales	Vello Pubiano	Genitales	Vello Pubiano
I	Aspecto infantil	Aspecto infantil	Aspecto infantil	Aspecto infantil
II	Volumen testicular en 3 cc.	Escaso, largo, poco pigmentado, ligeramente rizado en la base del pene o del escroto.	Estadio de botón mamario: Areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo.	Vello escaso, distribuido en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado.
III	Enrojecimiento de la piel del escroto. Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo. Aumento progresivo del escroto.	Rizado, grueso más pigmentado (oscuro), de mayor cantidad.	Desarrollo del pezón y mayor crecimiento. El aspecto asemeja a la mama adulta.	Vello aumentado en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis a monte de venus.
IV	Aumento de la longitud y circunferencia del pene. Desarrollo del glande. Escroto ha aumentado más de tamaño. Piel del escroto más oscura,	Abundante características del adulto pero limitado al pubis.	La areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria. Aparecen corpúsculos de Morgani.	Características similares a las anteriores. Existen imitada al pubis o monte de venus.
V	Tamaño y características adulto.	Se extiende hacia la ingle y cicatriz umbilical. Adquiere características de adulto.	Configuración adulta. No hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria estando en un mismo plano	Distribucion característica de adulto, terminando en forma triangular.

