



Universidad del sureste
Campus Comitán
Licenciatura medicina humana



Tema:

Cuadro sinóptico

Alumna:

Paola Guadalupe Hilerio González

Grupo: "A"

Grado: 3°

Materia:

epidemiologia

Docente:

Cecilio Culebro Catellanos

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de octubre

SHIGELLSA

-Bacilo Gram nega
 Familia enterobacteriaceae

Infección bacteriana (shigelosis) causada por una familia de bacterias conocida como "Shigella"

serotipos
 Dysenteriae
 Flexneri -sonne
 Boydii

Distribución
 Mundial
 Endemica

Reservorio
 "Humana"
 En el intestino delgado

Periodo de incubación
 1-4 días

Diagnostico laboratorio
 Agor sangre
 cultivo
 muestra de heces
 Diagnostico diferencial
 salmonella
 campylobacter
 yersinia o
 parascito

susceptibilidad
 o
 Resistencia
 muy resistente
 puede dificultar
 en el tratamiento

Modo de transmisión
 contacto directo con persona contaminada
 -Moscas, fómites
 -Aguas contaminadas
 -Alimentos contaminado
 -Mala higiene en mano
 -vía fecal-oral
 -Juguetes contaminado

cuadro clínico
 Dolor abdominal
 Vómino, Nauseas
 Fiebre
 cefalea
 -Diarrea acuosa y heces con sangre
 -perdida de apetito
 -Malestar estomacal

Medidas de Prevención
 -saneamiento
 -Higiene en alimentos
 -Lavado de mano antes y despues de ir al baño
 -Evitar defecar en aire libre
 -coccción correcto de alimentos

Epidemiología
 Endemica
 -clima tropical o templado
 -Niños menores de 6 años
 -Edad y sexo a todo con mayor frecuencia en niños

Referencias bibliográficas

- **Infección por shigela - Síntomas y causas - Mayo Clinic**
<https://www.mayoclinic.org> › shigella › syc-20377529

- **Emergencia y diseminación de Shigella sonnei con ... - PAHO**
<https://www.paho.org> › documentos › alerta-epidemiologia

- **<http://www.anmat.gov.ar/webanmat/publicaciones/shigelosis.pdf>**