



**Universidad del sureste**  
**Campus Comitán**

**Licenciatura en Medicina Humana**

**Tema: caso clínico emergencia hipertensiva**

**Integrantes:**

**Rojas Velázquez Joan Natael**

**Brayan Velázquez Hernández**

**Grupo: "B"**

**Grado: Tercer semestre**

**Materia: Fisiopatología II**

**PASIÓN POR EDUCAR**

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 denoviembre del 2022



**Hemergencia**

**hipertensiva**

Caso clínico





# Caso clínico

Paciente varón de 59 años de edad Acude al Hospital de su localidad sobre las 17:00hr por cuadro de mareo. Se realiza anamnesis en la que el paciente refiere que está trabajando en el campo y que tras incorporarse bruscamente comienzo de modo súbito con sensación de mareo, sudoración profusa y vómitos. Ante persistencia del síntoma acude a su centro de salud. No dolor torácico, ni disnea.

## Antecedentes personales

- Hipertensión mal controlada
- Diabetes Mellitus tipo II en tratamiento con ADO desde hace pocos meses
- Dislipemia en tratamiento dietético.
- Ninguna intervención quirúrgica.
- En los días previos ha sufrido cuadro de mareos similares pero de menor intensidad.

## Antecedentes heredofamiliares

- Madre diabética mal controlada
- Padre diabético e hipertenso
- Hermana diabética



# PADECIMIENTO ACTUAL Y SINTOMATOLOGIA

Paciente al descender del vehículo y llegar al hospital comienza con cefalea brusca muy intensa , vómitos y palpitaciones. Persistencia del mareo.

# Exploración física:

- FC: 80 lpm
- Tensión arterial: 230/120 mmHg
- Buen estado general
- Bien hidratado
- Abdomen: Blando y depresible. No dolorosos. No megalias ,ni irritación peritoneal.
- Resto normal.
- Estado Neurológico: Normal

# Diagnostico presuntivo

- Crisis hipertensiva

## Exámenes complementarios

- Análisis general de orina
- BH
- Electrocardiograma
- Tomografía de cráneo





# DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO

Crisis hipertensiva: emergencia hipertensiva







Debido a los signos y síntomas del paciente , con base a los antecedentes patológicos el paciente presenta una crisis hipertensiva, clasificándola como emergencia hipertensiva. Por un mal tratamiento y por el esfuerzo físico que demanda su trabajo.

