



Brayan Velázquez Hernández

Sandy naxchieli

Súper nota

Sexualidad humana

Grupo: “B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 15/10/2022

ETS

GRUPO DE RIESGO

- CONDUCTA SEXUAL PROMISCUA
- TRANSMISION VERTICAL (FETO-NEONATO)
- TRANSMISION HEMATICA

RIESGO DE CONTAGIO SEGUN MUCOSA

- MUCOSA BOCAL CON MUCOSA BOCAL
- MUCOSA BOCAL CON MUCOSA GENITAL
- MUCOSA CON MUCOSA GENITAL - A RECTAL
- MUCOSA BOCAL CON MUCOSA ANORECTAL
- MUCOSA GENITAL CON MUCOSA GENITAL

CLAMIDIA

(síntomas)

EN LA MUJER =

- SECRECION VAGINAL, MUCOPURULENTO
- DOLOR EN EL VIENTRE

EN EL HOMBRE =

- SECRECION ANORMAL EN EL PENE
- MOLESTIA AL ORINAR
- ESCOZOR.

TRATAMIENTO

ANTIBIOTICOS

SIFILIS

SINTOMAS


SIFILIS PRECOZ - 3 semanas o 3 meses
Ulceras, ANO - BOCA.

SIFILIS SECUNDARIA - hasta 6 meses
manchas - pecho - espalda - extremidades.

SIFILIS TERCIARIA - 10 o 20 años
Lesionen el sistema circulatorio nervioso

TRATAMIENTO

- PENICILINA G BENZATINICA
- ABSTENERSE DE RELACIONES SEXUALES HASTA SICALTRIZAR.



VIH

infeccion causada por el virus VIH

produce el SIDA

Puede ser asintomático + aun así transmitir el virus.

TRANSMISION

VIA SEXUAL.
Forma mas frecuente.

VIA-parental
Intercambio de agujas o cualquier material con cantidades de sangre.

TRANSMISION VERTICAL
Madre e hijos ya se durante el embarazo PARTO - LACTANCIA

TRATAMIENTO →

- FARMACOTERAPIA PARA VIH
- INSISTIR EN PRACTICAS SEXUALES USANDO PRESERVATIVOS.



GONORREA →

SINTOMAS → EXISTE 50% ASINTOMATICAS DIFICULTA SU CONTROL.

- EXUDADO PURUTERO
- SINTOMAS MICCIONALES Y EXUDADO PURULENTO URETRAL.
- FORMA ANAL - TENCION, DOLOR + RECTORRAGIAS

TRATAMIENTO → DOXICICLINA + CEFTRIAXONA