

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

Tema: CASO CLÍNICO

Llenifer Yaquelin Garcia Diaz

Rosa del Carmen Hernández Hernández

3 "C"

Fisiopatología II

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

PASIÓN POR EDUCAR

Căso Clínico

(aneurismă de la aorta toracică)

Paciente masculino de 40 años de edad, llega a la consulta por presentar cuadro de tos y disnea , además de presentar dolor de garganta y fiebre no cuantificada . Como antecedentes heredofamiliares el paciente nos dice que fue criado únicamente por su madre la cual hoy en día es diabética.

El paciente refiere que padece de insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial, nos menciona que estuvo fuera de la ciudad y haber estado en contacto con personas con infecciones respiratorias sin tratamiento .

A la exploración física presenta: edema a nivel facial, dolor a la palpación a nivel torácico esto aparentemente por la tos y se observa una dilatación de los vasos sanguíneos del cuello, dentro de sus signos vitales el paciente se encuentra:

FC: 100/60 FR: 12 rpm Glucosa: 100mg/dl SatO₂: 80%



¿Cual es el diagnóstico probable?

Infección de vías respiratorias superiores

¿Que estudios se solicitará? ¿que se espera encontrar?

Se le solicita al paciente que debe realizarse un exudado faríngeo , donde se espera encontrar al agente causal.

¿Que tratamiento se le administrará?

De acuerdo a los resultados el agente causal es bacteriano, por lo que se le receta antibióticos.

El paciente vuelve acudir al médico al no presentar mejoría por lo que se le solicita realizarse una radiografía de tórax PA en bipedestación y se le solicita llegar de nuevo con los resultados para su lectura

*DX: SE LE DETECTO UN ENSANCHAMIENTO DEL
MEDIASTINO MAYOR DE 55 mm., por lo que se concluyo en UN
ANEURISMA DE LA AORTA TORÁCICA*

*Como tratamiento se le realizará una cirugía para la colocación de una
prótesis.*

Justificación

En los pacientes con aneurismas siempre son diagnosticados por hallazgos, estos se originan por una asociación a la aterosclerosis y la hipertensión. La mayoría de las veces los pacientes son asintomáticos y en cuanto los pacientes presentar síntomas es debido a un crecimiento rápido del aneurisma, por lo que el tratamiento debe ser quirúrgico .

Estudios confirmatorios

Con una radiografía de tórax PA se identifica el ensanchamiento del mediastino provocado por el grosor del aneurisma