



**CANCINO RAMOS ADRIANA
GUADALUPE**

DR. DANIEL LÓPEZ CASTRO

ENTREGA DE TRABAJO FINAL

CRECIMIENTO Y DESARROLLO I

PASIÓN POR EDUCAR

3° "C"

Estadios de Tanner y el desarrollo sexual del varón y de la mujer

INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DEL VARON

Estadio	Genitales	Edad Prom.	Vello pubiano	Edad Prom.
I	Aspecto infantil		Aspecto infantil	
II	Volumen testicular en 3 cc.	11.64	Escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto.	13.4
	Enrojecimiento de la piel del escroto.			
III	Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo.	12.85	Rizado, grueso más pigmentado (oscuro), de mayor cantidad.	13.9
	Aumento progresivo del tamaño del escroto.			
IV	Aumento de la longitud y circunferencia del pene.	13.77	Abundante características del adulto pero limitado al pubis	14.4
	Desarrollo del glande. Escroto ha aumentado más de tamaño. Piel del escroto más oscura.			
V	Tamaño y características adulto.	14.72	Se extiende hacia ingle y cicatriz umbilical. Adquiere características del adulto.	15.2

Estadios de Tanner y el desarrollo sexual del varón y de la mujer

INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DE LA MUJER

Estadio	Genitales	Edad Prom.	Vello pubiano	Edad Prom.
I	Aspecto Infantil		Aspecto infantil	
II	Estadio de botón mamario: areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo.	11.5	Vello escaso, distribuido en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado.	11.7
III	Desarrollo del pezón y mayor crecimiento. El aspecto asemeja a la mama adulta.	12.5	Vello aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o monte de venus.	12.4
IV	La areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria. Aparecen corpúsculos de Morgani.	14.4	Características similares a las anteriores. Extensión limitada al pubis o monte de venus.	
V	Configuración adulta. No hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria, estando en un mismo plano.	14.4	Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular.	14.4

*Fuente: Estadios de Tanner y el desarrollo sexual del varón y de la mujer.

De acuerdo con los hallazgos obtenidos (por características raciales puede haber variación en la distribución y cantidad del vello), se debe clasificar de la siguiente manera:

- Adecuado: Cuando los caracteres sexuales secundarios y crecimiento de los órganos genitales presenten un desarrollo correspondiente a su edad y sexo,
- precoz: Cuando los caracteres sexuales secundarios y crecimiento de los órganos genitales presentan un desarrollo mayor que los correspondientes a la edad y sexo (habitualmente antes de losnueve años de edad),
- Retardada: Cuando los caracteres sexuales secundarios y crecimiento de los órganos genitales presentan un desarrollo menor que lo correspondiente a su edad y sexo (habitualmente después de los14 años).

Se debe mantener control subsecuente de acuerdo con los siguientes hallazgos:

- Maduración sexual adecuada, se debe citar a control subsecuente con la periodicidad establecida en esta Norma.
- Los comprendidos en la clasificación dentro de maduración sexual precoz y retardada deben referirse a un servicio de atención médica especializada para atender el problema y una vez restablecido el mismo, continuar el control en el primer nivel de atención.

Bibliografía

Secretaría de Salud. (1994, 28 noviembre). NORMA Oficial Mexicana NOM -008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. .. Recuperado 9 de septiembre de 2022, de https://www.ucof.mx/content/cms/13/file/NOM/NOM_008_SSA2.pdf