

**Nombre del alumno: Jorge Daniel Hernández  
González**

**Nombre del doctor: Daniel López Castro**

**Nombre del trabajo: Estadios de Tanner y desarrollo sexual del  
varón y de la mujer**

**Materia: Crecimiento y desarrollo**

**Grado: 3**

**Grupo: C**

Villa Las Rosas, Chiapas a 16 de septiembre del 2022.

## Indicadores del desarrollo sexual del hombre y de la mujer

Estadio	Sexo	Genitales	Edad promedio	Vello púbico	Edad promedio
I	Hombre	Aspecto infantil	0-11 años	Ausentes	0-11 años
	Mujer	Aspecto infantil	0-11 años	Ausentes	0-11 años
II	Hombre	Volumen testicular en 3cc y el enrojecimiento de la piel del escroto.	11 años y 7 meses aproximadamente.	Escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto.	13 años y 5 meses aproximadamente.
	Mujer	Pigmentación, la mama y el pezón son elevados formando un montículo y areola aumentada de diámetro.	11 años y 6 meses aproximadamente.	Vello escaso distribuido en labios mayores, fino, liso y poco pigmentado.	11 años y 8 meses aproximadamente.
III	Hombre	Aumento del pene en longitud con pequeño, aumento en la circunferencia del mismo.	12 años y 10 meses aproximadamente.	Rizado, grueso, más pigmentación, de mayor cantidad.	13 años y 9 meses aproximadamente.
	Mujer	Desarrollo del pezón, crecimiento, el aspecto asemeja a la mama adulta.	12 años y 6 meses aproximadamente.	Aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o monte de venus.	12 años y 4 meses aproximadamente.

<b>IV</b>	Hombre	Aumento de la longitud y circunferencia del pene, desarrollo del glande, escroto aumentado de tamaño y piel del escroto más oscura.	13 años y 7 meses aproximadamente.	Características similares a las anteriores, extensión limitada al pubis o monte de venus.	14 años y 4 meses aproximadamente.
	Mujer	La areola continúa creciendo, así mismo aparecen corpúsculos de Morgani.	14 años y 4 meses aproximadamente.	Abundante, características del adulto, pero, limitado al pubis.	14 años y 4 meses aproximadamente.
<b>V</b>	Hombre	Tamaño y características de un adulto.	A partir de los 14 años.	Se extiende hacia la ingle y cicatriz umbilical, adquiriendo características de adulto.	A partir de los 14 años.
	Mujer	Configuración adulta, no hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria estando en un mismo plano.	A partir de los 14 años.	Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular.	A partir de los 14 años.