

Llenifer Yaquelin García Díaz

Dr. Daniel López Castro

**Cuadro comparativo de la escala de Tanner
del hombre y la mujer**

Crecimiento y Desarrollo

“3”

“C”

ESCALA DE TANNER (ESTADIOS)

INDICADORES DEL DESARROLLO SEXUAL DEL HOMBRE Y LA MUJER

ESTADIO	GENITALES		EDAD PROMEDIO		VELLO PUBIANO		EDAD PROMEDIO	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
I	Aspecto Infantil	Aspecto Infantil			Aspecto Infantil	Aspecto Infantil		
II	Estadio de botón mamario: Areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo	<ul style="list-style-type: none"> • Volumen testicular en 3 cc. • Enrojecimiento de la piel del escroto. 	11.5	11.64	Vello escaso distribuido en los labios mayores, fino, liso poco pigmentado.	Escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto.	11.7	13.4
III	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del pezón y mayor crecimiento. • El aspecto asemeja a la mama adulta 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo. • Aumento progresivo del tamaño del escroto 	12.5	12.85	Vello aumenta en cantidad, comienza a espaciarse hacia el pubis o mente de venus	Rizado, grueso, más pigmentado (oscuro), de mayor cantidad.	12.4	13.9
	<ul style="list-style-type: none"> • La areola continúa creciendo y forma un 	*Aumento de la longitud y circunferencia del pene. *Desarrollo del	14.4	13.77	<ul style="list-style-type: none"> • Características similares a las anteriores. 	Abundantes características del adulto pero limitado al pubis		

IV	<p>montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparecen corpúsculos de Morgani 	<p>glande. *Escroto ha aumentado más de tamaño. *Piel del escroto más oscura</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Extensión limitada al pubis o monte de venus. 		14.4	14.4
V	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración adulta. • No hay separación de la areola del resto de la pirámide mamaria, estando en un mismo plano 	<p>*Tamaño y características adulto</p>	14.4	14.72	<p>Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se extiende hacia ingle y cicatriz umbilical. • Adquiere características del adulto 	14.4	15.2

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente.