



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITÁN**



LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

Nombre del alumno: Andrea Díaz Santiago

Tema: Estadios de Tanner y desarrollo sexual del varón y de la mujer

Grado: 3°

Grupo: C

Materia: crecimiento y desarrollo

Docente: Dr. Daniel López Castro

Fecha de entrega: 17 de septiembre de 2022

APENDICE "K" (Normativo)

HOMBRE

Estadio	Genitales	Edad Prom.	Vello pubiano	Edad Prom.
I	*Aspecto infantil		Aspecto infantil	
II	*Volumen testicular en 3 CC. *Enrojecimiento de la piel del escroto.	11.64	*Escaso, largo, poco pigmentado ligeramente rizado en la base del pene o del escroto.	13.4
III	*Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo *Aumento progresivo del tamaño del escroto	12.85	*Rizado, grueso más pigmentado (oscuro), de mayor cantidad	13.9
IV	*Aumento de la longitud y circunferencia del pene *Desarrollo del glande Escroto ha aumentado más de tamaño *Piel del escroto más oscura	13.77	*Abundante característica del adulto pero limitado a pubis	14.4
V	Tamaño y características adultas	14.72	*Se extiende hacia la ingle y cicatriz umbilical *adquiere características del adulto	15.2

APENDICE "K" (Normativo)

MUJER

Estadio	Genitales	Edad Prom.	Vello pubiano	Edad Prom.
I	Aspectos infantiles		Aspectos infantiles	
II	Areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo.		*Vello escaso, distribuido 11.7 en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado.	
III	*Desarrollo del pezón y mayor crecimiento *El aspecto asemeja a la +mama adulta	12.5	*Vello aumenta en cantidad, comienza a esparcirse hacia el pubis o monte de venus	12.4
IV	*La areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria. *Aparecen corpúsculos de Morgani	14.4	*Características similares a las anteriores *Extensión limitada al pubis o monte de venus	
V	*Configuración adulta. *No hay separación de la areola del riesgo de la pirámide mamaria, estando en el mismo plano	14.4	*Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular	14.4

APENDICE "K" (Normativo)

Cuadro comparativo

Estadio	Genitales	Genitales	Vello pubiano	. Vello	Edad promedio
I	*Aspecto infantil	Aspectos infantiles		Aspectos infantiles	
II	*Volumen testicular en 3 CC. *Enrojecimiento de la piel del escroto.	Areola aumentada de diámetro y pigmentada, la mama y el pezón son elevados formando un montículo.		*Vello escaso, distribuido 11.7 en los labios mayores, fino, liso, poco pigmentado.	12.4 - 13.4
III	*Aumento del pene en longitud con pequeño aumento en la circunferencia del mismo *Aumento progresivo del tamaño del escroto	*Desarrollo del pezón y mayor crecimiento *El aspecto asemeja a la +mama adulta		*Vello aumenta en cantidad, comienza a esparcirse hacia el pubis o monte de venus	13.9
IV	*Aumento de la longitud y circunferencia del pene *Desarrollo del glande Escroto ha aumentado más de tamaño *Piel del escroto más obscura	*La areola continúa creciendo y forma un montículo secundario que sobresale de la pirámide mamaria. *Aparecen corpúsculos de Morgani		*Características similares a las anteriores *Extensión limitada al pubis o monte de venus	14.4
V	Tamaño y características adultas	*Configuración adulta. *No hay separación de la areola del riesgo de la pirámide mamaria, estando en el mismo plano		*Distribución característica del adulto, terminando en forma triangular	14.4 - 15.2

Bibliografía:

Estadios de Tanner y el desarrollo sexual del varón y de la mujer.

(S/f). Recuperado el 17 de septiembre de 2022, de [http://chrome-](http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgicfindmkaj/https://www.ucol.mx/content/cms/13/file/NOM/NOM_008_SSA2.pdf)

[extension://efaidnbmnnnibpcajpcgicfindmkaj/https://www.ucol.mx/content/c](https://www.ucol.mx/content/cms/13/file/NOM/NOM_008_SSA2.pdf)

[ms/13/file/NOM/NOM_008_SSA2.pdf](https://www.ucol.mx/content/cms/13/file/NOM/NOM_008_SSA2.pdf)