



Wilder Bossuet Ramírez Vázquez

Daniel López Castro

Crecimiento Y Desarrollo

Cuadro Comparativo Anexando los

Antibióticos, Antifímicos,

Antiparasitarios, Anticonvulsivantes y

Óvulos Vaginales.

Grado: 3 Grupo: "C"

Comitán de Domínguez , Chiapas a 13 de Octubre de 2022

# CATEGORÍA DE MEDICAMENTOS SEGÚN RIESGO FETAL

A	No existe riesgo sobre el feto. Aprobado su uso en el embarazo.	<b>OVULOS VAGINALES</b>	
B	No existe evidencia de riesgo en fetos humanos. Existe posible evidencia de toxicidad en animales.	CLOTRIMAZOL	B
C	El riesgo sobre el feto, en humanos, es desconocido. Existe evidencia definitiva de toxicidad fetal en animales.	MICONAZOL	B
D	Existe evidencia de daño sobre el feto. Puede utilizarse, en caso de que se justifique su beneficio y no exista otra alternativa.	NUTOCONAZOL	C
X	Esta contraindicado su uso durante el embarazo.	NISTATINA	B
<b>ANTIBIÓTICOS</b>	<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>ANTIFÍMICOS</b>	
PENICILINAS	B	ETAMBUTOL	B
CEFALOSPORINAS	B	RIFAMPICINA	C
MONOBACTÁMICOS	B	ISONIAZIDA	C
CARBAPENEMOS	C	<b>ANTIPARASITARIOS</b>	
TETRACICLINAS	D	MEBENDAZOL	C
<b>AMINOGLUCOSIDOS</b>		METRONIDAZOL	B
GENTAMICINA	C	QUININA	X
AMIKACINA	C	CLOROQUINA	C
KANAMICINA	D	PRIMETAMINA	B
ESTREPTOMICINA	D	PRAZICUANTEL	C
TOBRAMICINA	C	<b>ANTICONVULSIVANTES</b>	
<b>MACROLIDOS</b>		DIFENILHIDANTOINA	D
ERITROMICINA	B	FENOBARBITAL	D
CLARITROMICINA	C	ACIDO VALPROICO	D
AZITROMICINA	B	CARBAMAZEPINA	C
VANCOMICINA	C	ETOSUXIMIDA	C
CLINDAMICINA	B	PRIMIDONA	D
QUINOLONAS	C	TRIMETADIONA	D
METRONIDAZOL	B	CLONAZEPAM	C
TRIMETROPIM-SULFAMETOXAZOL	C	LAMOTRIGINA	C
SULFAMIDAS	B	GABAPENTIN	C
NITROFURANTOÍNA	B		
ZIDOVUDINA	D		
<b>AGENTE TERATOGENO</b>	<b>EFECTOS</b>		
TABACO	PESO BAJO AL NACIMIENTO, PARTO PRETERMINO, PLACENTA PREVIA, DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA Y ABORTO		
ALCOHOL	RESTRICCIÓN EN EL CRECIMIENTO INTRAUTERINO, DISFUNCIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, MICROCEFALIA, MALFORMACIONES EN CARA Y OTROS ÓRGANOS		
COCAÍNA	ATRESIA DE INTESTINO, MALFORMACIONES EN CORAZON, RIÑON Y CARA, MICROCEFALIA, RESTRICCIÓN EN EL CRECIMIENTO INTRAUTERINO, LESIONES CEREBRALES, MUERTE FETAL, ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE.		
CUMARINA (WARFARINA)	SÍNDROME WARFARÍNICO CUANDO SE ADMINISTRA EN LA SEMANA 6 A 10 DE LA GESTACIÓN: HIPOPLASIA NASAL, MICROFTALMIA, HIPOPLASIA DE EXTREMIDADES, RESTRICCIÓN EN EL CRECIMIENTO INTRAUTERINO, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.		
YODO RADIOACTIVO	ALTERACIONES EN LA GLANDULA TIROIDES DEL FETO.		
TALIDOMIDA	FOCOMELIA, MALFORMACIONES EN CORAZON Y GASTROINTESTINALES		
RETINOIDES Y DERIVADOS	ABORTO, DEFECTOS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, AGENESIA DEL TIMO, MALFORMACIONES EN CORAZÓN, DISMORFISMO CRANEOFACIAL, MICROFTALMIA.		

# BIBLIOGRAFIA

- Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.

<file:///C:/Users/wil28/Downloads/NOM-007-SSA2-2016%20Embarazo,%20parto%20y%20puerperio.pdf>