

# CONDICIONES SIMPLES

## APERGAMIENTO

Lesión superficial de la piel. Absente traumático actúa por fricción desgarrando estratos córneos, como consecuencia se derrama la linfa, la cual coagula la sangre y da el tinte amarillento.

## EXCORIACIÓN

Lesión superficial de la piel cubierta de sangre frotao, como el contorno puede presentar reacción inflamatoria. Depende de estratos más profundos de la epidermis. Absente traumático: lo fricción. Abrasión o lesión epidermica. Resultado de una vibración transicional o por fricción al caminar, con desgarramiento de los primeros granos de la epidermis.

## ECQUIMOSIS

Del griego: extrusión, extrusión sanguínea superficial o profunda, caracterizada por la ruptura de vasos sanguíneos, generalmente capilares, con hemorragia e infiltración de los tejidos circundantes, ocasionada por la acción del agente traumático.

## DERRAMES DE VASOS

son la acumulación de líquidos orgánicos (sangre, sero, linfa). Resultado de la acumulación de sangre en una cavidad formada por estancamiento en el espesor de la dermis, sin sobrepasar la agoneurisis mesoderm superficial. También puede ser subagoneurios o subagoneurios (cutáneos o viscerales).

## HERIDA CONTUSA.

Dentro de esta clasificación podemos incluir la mordedura: clasificada como lesión de la piel producida por los dientes, ocasionada por medio de la presión y luego por tracción, en algunos casos, a la lesión por impacto o caídas (accidentes).