

Adrian Cancinos

MVZ 4TO

ZOONOSIS Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

MEDICO : BARREDA ROBERTO
GARCIA SEDANO



Brucelosis

El diagnóstico LABORATORIO

de brucelosis se puede realizar de manera directa, **aislando el microorganismo a partir de cultivos de sangre, médula ósea u otros tejidos o indirecta a través de métodos serológicos que detectan anticuerpos.**

¿Cómo se trata la brucelosis? El tratamiento son los **antibióticos**. El tratamiento debe ser combinado, ya que ningún antibiótico por si solo consigue la erradicación bacteriana, y debe, asimismo, prolongarse en el tiempo para disminuir el riesgo de cronicidad y de recidivas, que es máximo en la B.

Síntomas

Los síntomas de la brucelosis se pueden presentar pocos días o meses después de haberte infectado. Los signos y síntomas son similares a los de la influenza y pueden ser:

- Fiebre
- Escalofríos
- Pérdida de apetito
- Sudores

Descripción general

La brucelosis es una infección bacteriana que se transmite de los animales a las personas. Lo más común es que las personas se infecten al comer productos lácteos crudos o sin pasteurizar. Algunas veces, las bacterias que causan la brucelosis se propagan por el aire o por el contacto directo con animales infectados.

ETIOLOGIA

Resultados de búsqueda

Fragmento destacado de la Web

La brucelosis es una **infección bacteriana que se transmite de los animales a las personas.**

Lo más común es que las personas se infecten al comer productos lácteos crudos o sin pasteurizar. Algunas veces, las bacterias que causan la brucelosis se propagan por el aire o por el contacto directo con animales infectado

Causas

La brucelosis afecta a muchos animales salvajes y domésticos, entre ellos:

- Ganado
- Cabras
- Ovejas
- Cerdos y jabalíes