

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA**

**ZOOTECNIA
DE
PEQUEÑAS ESPECIES**

**CATEDRATICO: ETI JOSEFINA
ARREOLA RODRIGUEZ**

**ALUMNA: RAQUEL VIRGINIA
RIZO ESCALANTE**

**MAPA
COCEPTUAL**

17/11/2022

CICLO REPRODUCTIVO PERRA Y GATA

Ciclo estral de la perra

Las perras se clasifican como hembras monoéstricas estacionales, esto quiere decir que presenta un estro una o dos veces al año, a intervalos de 5 a 10 meses. A continuación veremos las diferentes fases del ciclo sexual.

ANESTRO: periodo prolongado que dura alrededor de unos cuatro meses. En este periodo la hembra no evidencia signos de actividad ovárica.

PROESTRO: periodo de importante actividad folicular, se caracteriza por la aparición de signos tales como edema de la vulva, descarga vaginal sanguinolenta y atracción del macho. Esta fase dura unos 9 días.

ESTRO: destaca la receptividad sexual por parte de la hembra y una marcada queratinización del epitelio vaginal. La duración promedio de esta fase es de 9 días. Durante el primer tercio del estro suele tener lugar la ovulación e inicio del desarrollo de los cuerpos lúteos.

DIESTRO: esta fase aparece cuando finaliza la receptividad sexual y el nivel de queratinización celular del epitelio vaginal disminuye significativamente. El periodo de diestro dura alrededor de 60 a 90 días.

El ciclo estral felino se divide en cuatro períodos: proestro, estro, interestro y anestro. Cada etapa presenta ciertas particularidades que diferencian una de otra. Existen evidencias que sugieren una producción espermática estacional en el gato al igual que lo que ocurre en otras especies.

El celo viene a durar unos 15-18 días, y suele producirse generalmente cada 6 meses, aunque hay razas como el pastor alemán que tienen intervalos más cortos.

En las gatas el ciclo se caracteriza por ser estacional, esto es, que entran en períodos de celo en determinadas etapas del año

