

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA**

ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES

**CATEDRATICO: ETI JOSEFINA
ARREOLA RODRIGUEZ**

**ALUMNA: RAQUEL VIRGINIA
RIZO ESCALANTE**

**REPRODUCCION
CANINOS
Y
FELINOS**

04/12/2022

REPRODUCCION

CANINOS

FELINOS

Ciclo

Las perras se clasifican como hembras monoéstricas

Estral de

Estacionales, esto quiere decir que presenta un estro una o

La perra

Dos veces al año

ANESTRO: periodo prolongado que dura alrededor de 4 Meses. En este periodo la hembra no evidencia signos de Actividad ovárica.

PROESTRO: periodo de importante actividad folicular, se Caracteriza por la aparición de signos tales como edema de La vulva, descarga vaginal sanguinolenta y atracción del Macho. Esta fase dura unos 9 días.

ESTRO: destaca la receptividad sexual por parte de la Hembra y una marcada queratinización del epitelio vaginal. La duración promedio de esta fase es de 9 días. Durante el Primer tercio del estro suele tener lugar la ovulación e inicio Del desarrollo de los cuerpos lúteos.

DIESTRO: esta fase aparece cuando finaliza la receptividad sexual y el nivel de queratinización celular del epitelio vaginal disminuye significativamente. El periodo de diestro dura alrededor de 60 a 90 días

Pseudogestación o embarazo psicológico (Pseudociesis)

La pseudogestación es una condición fisiológica que se genera a partir del DIESTRO y que solo eventualmente podría constituir un trastorno. Es una exageración del fenómeno fisiológico normal de la perra no gestante, que completa la fase luteínica del ciclo estral.

FELINO

Entre los 5-12 meses, la hembra ya está lista para reproducirse

Los machos, en cambio, tardan un poco más: entre los 8 y los 12 meses. "estro", puede ir 3 a 10 días Proestro (1-2 días). Comienza el ciclo de ovulación Estro (1-7 días). Interestro (7-14 días)

Anestro. Etapa de reposo

DESPARACITACION

Los parásitos se instalan en el tracto digestivo cuando los pequeños están dentro del vientre de la madre, y se alimentan de todo lo que los cachorros ingieren, pudiendo ocasionarles una desnutrición severa.

En el momento en que tu cachorro salga a la calle y empiece a dar sus primeros paseos, se expondrá fácilmente al contagio de

Parásitos externos. Entre los más comunes, figuran las pulgas y las garrapatas.

La desparasitación interna tanto en perros como en gatos trata de evitar los parásitos intestinales como gusanos o lombrices que pueden ocasionar daños en su salud.

Los parásitos pueden clasificarse en tres grandes grupos según el aspecto que presentan sus formas adultas cuando se encuentran en el intestino de los animales

VACUNACION

La edad de vacunación de los cachorros está ligada al estado inmunitario de sus madres. La importancia de la transferencia de inmunidad pasiva a través de la placenta y especialmente a través de la absorción del calostro durante las primeras horas de vida es fundamental para la sobrevivencia de la cría.

