



BRANDON EDUARDO CHANG ANTILLON 7tmo cuatrimestre

**LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECCIA**

**SERGIO**  
CHONG VELAZQUEZ

## ALIMENTACION DE OVEJAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS

### Manejo y alimentación de ovinos

Es necesario conocer el estado del ciclo de producción en el que se encuentra cualquier grupo determinado de ovejas en todo momento, para poder separarlas y manejarlas correctamente. La clave para maximizar los rendimientos productivos reside en alimentar para la producción, conocer en que etapa de producción están los animales que se están alimentando y minimizar los costos de alimentación evitando la alimentación extra innecesaria.

### Mantenimiento (periodo seco):

Como las ovejas solo necesitan mantener su peso, aplicar concentrado ( 0.5 a 1.0 libras) si: el forraje es pobre y si perdieron mucho peso en la lactancia.

### Lactancia:

Las ovejas alcanzan su pico de producción de leche aproximadamente a las 3 a 4 semanas después del parto y producen el 75% de su producción total de leche en las primeras 8 semanas de lactancia.

### Hay seis (6) etapas importante de producción:


1. mantenimiento.
2. Flushing (acondicionamiento).
3. reproducción.
4. inicio de la gestación.
5. Final de la gestación.
6. Inicio de la lactancia.

### Flushing (acondicionamiento) y reproducción:

Flushing es la práctica de aumentar la ingestión de alimento y mejorar las condiciones corporales de las ovejas antes y después de la monta o inseminación. El propósito es aumentar el valor de

### Agua

En nuestras condiciones tropicales el agua es el nutriente más importante. El rebaño debe tener una fuente de agua fresca y limpia permanente. Se recomienda una superficie de agua de 0.10 m<sup>2</sup> por 40 ovejas.  
Programa de manejo de los corderos



### Inicio de la gestación( 15 semanas antes del parto):

En esta etapa el crecimiento fetal es bajo y el requerimiento de nutrientes es similar a la etapa de mantenimiento.

### DESTETE TEMPRANO

Los productores que practican un programa de destete temprano deben mantener sus ovejas en condiciones corporales óptima, para obtener éxitos en sus programa de partos. Los animales no deben perder condiciones corporales durante la lactancia, para lograr un buen desempeño y que produzcan un buen número de corderos con