



BRANDON EDUARDO CHANG

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

ETI JOSEFINA

ARREOLA RODRIGUEZ

CONEJOS

Cómo se reproducen los conejos?

Este tipo de cópulas pueden desencadenar en la coneja una pseudogestación, es decir, su cuerpo reaccionará como si se hubiese producido la fecundación. Ahora que sabemos cómo se reproducen los conejos, nos queda indicar que la gestación en esta especie dura unos 30-32 días, al término de los cuales las conejas parirán de 1 a 5 gazados.

INSEMINACION CONEJOS

En la práctica, la **inseminación** artificial de **conejos** se refiere al proceso de introducir directamente en la vagina un **conejo** de una cierta dosis de semen (esperma) de un **conejo** macho, que se probó con antelación y, si es necesario, se diluyó.

Pubertad

4-6 meses de vida

En los conejos la pubertad aparece a los **4-6 meses de vida** y en condiciones normales la productiva de una hembra o de un macho es de unos 3 años aproximadamente y el promedio de una granja es de 2 años de producción.

LACTANCIA

El período de gestación de los conejos dura aproximadamente 32 días y la lactancia dura **56 días**, lo cual da un total de 88 días. También suelen tener camadas varias veces al año, de entre 4 y 12 crías. Esto quiere decir que una hembra está diseñada para poder tener al menos 4 camadas en un año.

Las causas más frecuentes del canibalismo en los conejos son los siguientes:

- Falta de agua.
- Deficiencias en la alimentación.
- Manejo inadecuado.
- Nerviosismo en la coneja.
- Cruzamientos con sanguíneos

PUBERTAD

La pubertad de las conejas se alcanza en general cuando llegan al **70-75 por ciento del peso adulto**. Sin embargo, con frecuencia es preferible esperar a que hayan alcanzado el 80 por ciento de dicho peso para iniciar la reproducción.