

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

ZOOTECNIA DE CONEJOS

CATEDRATICO: ETI JOSEFINA
ARREOLA RODRIGUEZ

ALUMNA: RAQUEL VIRGINIA
RIZO ESCALANTE

CUADRO SINOPTICO

04/12/2022

CONICULTURA

Artificial La inseminación es la aplicación del semen diluido mediante una cánula de Inseminación y la deposición del mismo en la vagina. La coneja a diferencia de otras especies es de ovulación inducida. En Monta natural, el estímulo del macho durante la cópula desencadena la ovulación de la hembra.

PUBERTAD En los conejos la pubertad aparece a los 4-6 meses de vida y en Condiciones normales la productiva de una hembra o de un macho Es de unos 3 años aproximadamente y el promedio de una granja es De 2 años de producción.

LACTANCIA Las conejas solo amamantan a sus gazapos una o dos veces al día. Esto se realiza de una forma rapidísima y puede durar menos de un minuto. El resto del tiempo la coneja se mantendrá alejada del nido para no atraer a los depredadores. Antes de intervenir hay que comprobar el estado de los gazapos

CANIBALISMO El canibalismo también se da en conejos y mayormente ocurre cuando hay una deficiencia nutricional. En la foto mostrada, la coneja no recibió alimento alguno por varios días lo que hizo que al momento del parto se comiera a sus crías. Esto también se da cuando el suministro de agua es insuficiente

CANIBALISMO