



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**TEMA: MANEJO**

**MATERIA: ZOOTECNIA DE CONEJOS**

**PROFESORA: MVZ ETY ARREOLA  
RODRIGUEZ**

**ALUMNO: EMVZ ERNESTO MARTINEZ  
ESPINOSA**

**7° CUARTRI ACT.1 PAR.4 “CUADRO SINOPTICO”**



# REPRODUCCION

## OVULACION

Es un acto donde la coneja doméstica, su ovulación puede ser de carácter inducido o reflejo, lo cual significa que para que tenga lugar la dehiscencia folicular requiere del estímulo genital provocado por el coito o por algún estímulo equivalente.

## CICLO ESTRAL

El ciclo estral no puede tener una duración definida. Estrictamente no existe un ciclo sexual regular, sino un ritmo de receptividad sexual ligado al crecimiento folicular.

## PUBERTAD Y MADUREZ SEXUAL

La pubertad es un proceso biológico experimentado por todo individuo, que se caracteriza por la aparición de una serie de cambios hormonales que traen como consecuencia la actividad esteroidógena y gametógena.  
Las razas pequeñas entran a la pubertad aproximadamente entre los 2 y 3 meses de edad; las medianas, entre los 3 y los 4; y las gigantes, entre los 4 y 5 meses de edad.

## APAREAMIENTO Y FECUNDACION

Revisar la vulva: si está hiperémica y, por lo tanto, manifiesta una coloración intensamente roja y brillante, está en estro y aceptará la monta.

La fecundación-gestación: cuando la vulva es rojiza, hay de 80 a 85% de probabilidades de que la coneja quede gestante; si la vulva es morada violeta, de 50 a 60%

## GESTACION

La gestación en la coneja doméstica dura en promedio 31 días, aunque su rango oscila entre 30 y 35. En las conejas salvajes el rango es aún más amplio 27-36 días.

## PARTO

Para que la coneja pueda parir es necesario proporcionarle un nidal acondicionado con material de cama, aproximadamente a los 29 o 30 días postapareamiento.

## CANIBALISMO

Por lo general, el canibalismo es producto de un mal manejo y no es privativo de la coneja. El mal manejo puede tener las siguientes causas: carencia de alimento y de agua, falta de higiene en la jaula de la hembra, disposición inapropiada (fuera de tiempo) del nidal, exposición a ruidos extraños antes, durante e inmediatamente después del parto; detección visual, auditiva y olfativa

## LACTANCIA

A diferencia de las liebres tienen los ojos cerrados, esto lo vuelve crítico al no poder tomar la suficiente cantidad de calostro.  
Poseen 4 pares de pezones las conejas de raza mediana  
Por gazapo toman de 1.5—2 minutos.

## INSEMINACION ARTIFICIAL

La inseminación artificial (IA) es una técnica ideada y desarrollada especialmente para estimular el mejoramiento genético de los animales. permite la introducción periódica de material genético nuevo a la granja para disminuir el nivel de consanguinidad