



Universidad del sureste
“Pasión por educar”

Materia:

Zootecnia de conejos

Tema:

Cuadro sinóptico

Alumno:

María Teresa Castillo Tovilla

Tarea #:

3

Tapachula Chiapas, martes 29 de noviembre del 2022

Reproducción del conejo

Inseminación

es la aplicación del semen diluido mediante una cánula de inseminación y la deposición del mismo en la vagina. La coneja a diferencia de otras especies es de ovulación inducida. en monta natural, el estímulo del macho durante la cópula desencadena la ovulación de la hembra. Para la liberación de semen se necesitan vaginas artificiales donde se liberará el semen del conejo.

Pubertad

En los conejos la pubertad aparece a los 4-6 meses de vida y en condiciones normales la productiva de una hembra o de un macho es de unos 3 años aproximadamente y el promedio de una granja es de 2 años de producción.

Lactancia

Las conejas solo amamantan a sus gazapos una o dos veces al día. Esto se realiza de una forma rapidísima y puede durar menos de un minuto. El resto del tiempo la coneja se mantendrá alejada del nido para no atraer a los depredadores. Antes de intervenir hay que comprobar el estado de los gazapos. Destetando al mes y medio.

Canibalismo

el canibalismo se da sobre todo en conejas primíparas y puede ser debido a un exceso de nerviosismo, un déficit alimentario o una falta de agua en el momento del parto.

Madurez sexual

La edad conveniente para la reproducción es variable, dependiendo de la raza; las razas pesadas alcanzan la madurez sexual de 8 a 9 meses las hembras y los machos de 9 a 10 meses.

Bibliografía

- Conejos y gazapos, pedro Gonzales redondo, 2006. Recuperado el 29/11/22. file:///C:/Users/Personal/Downloads/Dialnet-ConsideracionesSobreLaSupervivenciaDeLosGazaposDeC-2869533.pdf