



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Hogla Rubí Sangeado Dominguez

Nombre del tema: Paladar Hendido

Parcial: 2ª Parcial

Nombre de la Materia: Enfermería En El Cuidado Del Niño Y El Adolescente

Nombre del profesor: E.Q Cecilia De La Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería

Cuatrimestre: 7ª Cuatrimestre

PALADAR HENDIDO

DEFINICION

El paladar se forma entre las semanas 6 y 9 del embarazo. El paladar hendido se produce cuando el tejido que forma el paladar no se une completamente durante el embarazo, en algunos bebés, tanto la parte de adelante como la parte de atrás del paladar quedan abiertas, En otros solo una parte del paladar queda abierta.



FACTORES DE RIESGO

- Cambio en genes.
- Tabaquismo durante el embarazo.
- Diabetes diagnosticada antes del embarazo.
- Uso determinado de ciertos medicamentos como para la epilepsia (Topiramato o Acido valproico).



DIAGNOSTICO

Las hendiduras orofaciales pueden diagnosticarse durante el embarazo por medio de una Ecografía de rutina.



MANEJO Y TRATAMIENTO

Los servicios y tratamientos para los niños con Hendiduras orofaciales pueden variar según la gravedad de la hendidura, edad y las necesidades del niño.

La cirugía para corregir el Paladar Hendido se recomienda que se realice en los primeros 18 meses de vida o antes si es posible.

Los niños con estos problemas pueden necesitar otros tipos de tratamientos y servicios como cuidados dentales, o de ortodoncia especiales y Terapia del habla.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

<https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/birthdefects/cleftlip.html>