

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE.**

***Enfermería en urgencia y desastre.***

*MODULO 1*



*NOMBRE DE LA ALUMNA:*

*REYNA DEL CARMEN MONTERO FELIX*

*7to cuatrimestres grupo "A"*

*LEN-Licenciatura en enfermería*

*ACTIVIDAD: mapa conceptual.*

*DOCENTE:*

*Lic. Víctor Geovani Montero López.*

*Fecha de entrega: 15/octubre/2022*

## **Alteraciones metabólicas.**

*El metabolismo es el proceso que usa el organismo para obtener o producir energía por medio de los alimentos que se ingieren, el organismo puede utilizar la energía de inmediato o almacenar las en tejidos corporales.*

*Los síntomas esta enfermedad v varían dependiendo del tipo de trastorno y pueden ser crónicos o pueden aparecer repentinamente presenta nauseas, pérdida de peso, falta de apetito, dolor abdominal, ictericia.*

*Los trastornos metabólicos se heredan comúnmente de la familia donde han heredado un gen defectuoso que resulta en deficiencia enzimática.*

*El trastorno metabólico hereditario causado por una deficiencia de la enzima fenilamina hidroxilasa puede provocar discapacidades físicas y de aprendizaje esto posa si no se trata.*

*Las enzimas y ciertos químicos no están disponibles se produce un trastorno metabólico, existen los trastornos que acumulan cierta enzima o química que no se puede descomponer, trastornos que tienen pocas enzimas y químicos.*

*La mayoría de los trastornos están causado por el hecho de que una sola enzima no la produce el cuerpo y solo pueden ser tratados.*

## **Paciente con hemorragia digestiva.**

*La hemorragia digestiva es la pérdida de sangre por el tubo digestivo ya que si no es atendida puede ser crónica o aguda ya sea según el volumen de sangre perdido.*

*Causa de la hemorragia baja; tiene distinta frecuencia de apariciones según la edad de los pacientes, los tumores y pólipos grandes del colon.*

*Esta se clásica en hemorragia digestiva alta; este se origina en el esófago, estómago y duodeno hemorragia baja esta se origina en el resto del intestino delgado y en el colon.*

*Se puede prevenir limitando el uso de medicamentos antiinflamatorios, limitar el consumo de alcohol, no fumar, si presenta alguna enfermedad gastroesofágica seguir las indicaciones del médico.*

*Síntoma de la hemorragia aguda es la visualización que le vientre se encuentre semidura, la hemorragia alta es una ulcera gástrica duodenal, lesiones difusas del recubrimiento interno del estómago.*

*Tratamiento; inyectar medicamentos en el sitio del sangrado, tratar el sitio del sangrado y el tejido circundante con una sonda de color y cerrar los vasos sanguíneos con una banda o un clip.*