



Nombre del alumno: Ángel Gabriel Gómez Guillen

Nombre del profesor: Carlos trujillo



Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootécnica

Materia: Zoonosis y salud publica

Cuatrimestre: 4to

Nombre del trabajo: Enfermedad del Moquillo canino

HISTORIA NATURAL DE EL MOQUILLO CANINO

Antes de la enfermedad

Huesped:
Canino

Agente:
El virus del moquillo canino suele ser más agresivo cuando afecta a cachorros con un sistema inmunitario inmaduro por no haber sido vacunados.

Medio ambiente:
Lo mejor es usar desinfectantes comunes como la lejía, pero es igualmente importante que se ventilen muy bien las habitaciones, se sequen, y que los objetos también se sequen y mejor aún con los rayos del sol, al aire libre.

Factores de riesgo:
El origen del perro, es el segundo de los factores de riesgo para analizar, considerando que el contagio del moquillo canino se produce, por:
Contacto directo de un perro enfermo con un perro susceptible, ya sea, por contacto nariz a nariz, inhalación de aerosoles en ambientes aéreos contaminados.



En el curso de la enfermedad

El moquillo es una enfermedad causada por el virus del moquillo canino.

Horizonte clínico

Signos y síntomas:

- Fiebre
- Problemas gastrointestinales
- Síntomas respiratorios
- Alteraciones nerviosas
- Formación excesiva de piel en la nariz y las almohadillas
- Problemas dentales

Diagnostico alternativo:

Es fundamental acudir al veterinario ante la mínima sospecha ya que este podrá evaluar con precisión y mediante un examen general el estado de salud del perro.

Bastará con una análisis de sangre con el que poder determinar el número de glóbulos blancos (leucocitos) y glóbulos rojos (eritrocitos).

El veterinario lleva a cabo diferentes pruebas de laboratorio (como muestras de orina, sangre, líquido frotis de conjuntiva y cefalorraquídeo) para detectar la presencia del virus del moquillo canino.

Muerte:

El **moquillo**, también conocido como "Distemper canino" es una de las primeras causas de muerte en **perros** por su alto riesgo de contagio, afectando a su sistema respiratorio, nervioso y digestivo.

Defecto:

Los perros no vacunados y con un sistema inmunitario debilitado por enfermedades, estrés o la edad son los más afectados.

Incapacidad

- La incoordinación
- La cabeza ladeada

- La parálisis facial y los temblores
- La debilidad en las patas traseras.

- Déficit visual
- Depresión mental

- Modificaciones de la personalidad
- Incapacidad para sostener la cabeza.


Prevencion primaria

Verificar que los perros cuenten con su esquema de vacunacion completa.

Los cachorros deben tener su primera vacunacion a partir de los 45 dias de vida mas refuerzos segun criterio medico.

Prevencion secundaria

Limpiar las heces y orina con agua y jabon, y/o hipoclorito de sodio en la dilucion recomendada.



Antes signos respiratorios, gstricos, dermatologicos o sistema nervioso como movimientos involuntarios o convulsiones, **consultar inmediatamente al medico veterinario**



Prevencion terciaria

Tratamiento

No existe actualmente ningún tratamiento específico para el moquillo en los perros. Pero sí existe una manera de prevenir el contagio y que es a través de la **vacunación**.

Existen medicamentos para las convulsiones. Asi que tambien hay que asegurarnos de que el animal coma y beba para no deshidratarse.

Rehabilitacion

Un animal en particular puede presentar algunos pocos o la mayoría de los síntomas descritos, dependiendo de la gravedad de la infección. El curso de la enfermedad puede ser de solo 10 días, pudiendo extenderse a varias semanas, y hasta meses, con períodos intermitentes de mejora seguidos de una recaída

Referencias

Del Pino, M. (1998). Cuidado con el moquillo. *Cambio* 16, (1389), 78-78.

Raurell, X., Centellas, C., & Feliz, G. (2018). Actualización en el diagnóstico del moquillo canino neurológico. *Argos: Informativo Veterinario*, (203), 56-58.

Wheeler, J. T. (2007). El moquillo canino ¿ tiene cura?. *REDVET. Revista electrónica de Veterinaria*, 8(7), 1-5.

Villalba, S. E. L., Salgado, A. M. C., & Garzón, L. H. V. (2010). Diagnóstico de moquillo canino con la prueba Dot-ELISA. *Revista Veterinaria y Zootecnia (On Line)*, 4(2), 77-84.