

Historia Natural

Antecedentes de la enfermedad

Huesped:

Caninos

Agente

El Parvovirus canino tipo 2
Representa la principal causa
de enteritis viral en perros.

Medio ambiente

El CPV-2 está presente en grandes
cantidades en materia fecal de
perros infectados desde donde
se transmite por contacto
oro-nasal al animal sano.

Factores de riesgo

El CPV-2 tiene alta resistencia
al medio ambiente, llegando a
durar con capacidad infectante
de 6 meses a 1 año.

SI
LE
IS

Natural del Parvovirus canino.

Muest. La grave sistema

Defecto
Los Perros Pequeños y No vac immune debilitado tienden a :

Incapacidad:

- Diarrea
- Vómitos
- Fiebre
- Falta de Afecto
- Apatía letargo
- Depresión
- Pérdida de Peso
- Dolor abdominal
- Deshidratación

Diagnostico Alternativo

La gastroenteritis hemorrágica, fiebre, leucopenia linfocitaria y vómitos en Perros Menores de 2 Años, son indicadores tentativos de CPV-2.

Signos y síntomas

Los primeros síntomas son caracterizados por letargia, fiebre, inapetencia, vómitos, deshidratación, diarreas sanguinolentas.

Muerte.
La gravedad de los síntomas en el cachorro dependerán de su sistema inmune, edad y número de vacunas.

Defecto

Los perros Peaveños y No vacunados o con un sistema inmune debilitado tienden a ser los más afectados.

- Apetito estorbo
- Pérdida de Peso
 - Dolor abdominal
 - Deshidratación

* La Prevención funciona:

La vacunación contra CPU-2 forma parte de las vacunas en Perros. se recomienda empezar desde las 6 a 9 semanas

- Protege contra los subtipos CPU-2a, CPU-2b y CPU-2c.