



**Mi Universidad**

## CUADRO SINOPTICO

Nombre del Alumno: Dominga contreras Jiménez

Nombre del tema: trastorno personalidad y parafilias

Parcial:1

Nombre de la materia: Psicopatología II

Nombre del profesor: Liliana Villegas López

Nombre de la Licenciatura: psicología

Pichucalco, Chiapas a 18 octubre del 2022

**UNIDAD III  
"TRASTORNOS  
DE LA  
PERSONALIDAD  
Y PARAFILIAS"**

**TRASTORNO DE  
LA  
PERSONALIDAD  
PARANOIDE**

Se define como una alteración de la personalidad. es decir.

Momento que el individuo tiene una especie de suspicacia con los respecto a los demás ejemplo

- ✚ Me va a engañar
- ✚ Me va estafar
- ✚ Están hablando de mi

**TRASTORNO DE  
LA  
PERSONALIDAD  
ESQUIZOIDE**

Es la escasa o casi nula necesidad afectiva. Es decir

Manifiestan poco dolor y placer lo que para otros es doloroso se ...

1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas.
2. Casi siempre elige actividades solitarias
3. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona.
4. Disfruta con pocas o con ninguna actividad.

**TRASTORNO DE  
LA  
PERSONALIDAD  
ESQUIZOTIPICO**

Es un patrón de comportamiento excéntrico se manifiesta

Habla  
La imagen  
Distorsiones cognitivas  
Baja habilidad para formar relaciones

Ideas inusuales  
Pensamientos mágicos  
Percepciones distorsionales  
Conductas

**TRASTORNO DE  
LA  
PERSONALIDAD  
ANTISOCIAL**

suele ser impredecible e incontrolable. Comportamientos como.

- ✚ **Conductas delictivas**
- ✚ **Falta de empatía**
- ✚ **Impulsivos**
- ✚ **Les cuesta cumplir con los demás**

Suelen justificar el robo o alguna otra acción

# TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y PARAFILIAS

## TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD LÍMITE

Es la salud mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás causan problemas como

- ✓ inestabilidad del estado de ánimo
- ✓ el comportamiento
- ✓ la conducta. Comienza en

En la edad adulta

## TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD HISTRIÓNICA

Son trastornos dramáticos de abuso y atención que se manifiestan por

- ✚ Se siente incómodo cuando no es el centro de atención.
- ✚ Cambia rápido en emociones
- ✚ Apariencia física para llamar la atención. Lenguaje dramático

## TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NARCISISTA

Extremo alterado de una forma de afrontar la vida arrogante y autosuficiente. Se caracteriza como

una gran imaginación, en la que las fantasías de gloria o éxito personal son frecuentes y poco ajustadas a la realidad.

Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, Cree que es "especial" Tiene una necesidad excesiva de admiración. Etc.

## TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD EVASIVA

tienen una imagen muy insegura y devaluada de sí mismos y creen que los demás opinarán lo mismo de ellos.

1. Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo.
2. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás
3. Se muestra retraído en las relaciones estrechas.
4. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales.
5. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación

## TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD DEPENDIENTE

Son personas con falta de confianza en sí mismo necesitan

Ellos necesitan aliento el respaldo y el consejo de sus seres más cercanos en las decisiones diarias.

Sienten un temor al abandono o rechazo emocional.

# TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y PARAFILIAS

## TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD OBSESIVO-COMPULSIVO

preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia.

se centra en una continua preocupación por los detalles, por el orden y por las normas.

## SADISMO SEXUAL

Se conoce con el nombre de parafilia cuando el interés o la excitación sexual de la persona está centrada en fantasías o comportamientos sexuales recurrentes

**Es lo que provoca malestar significativo, afecta sustancialmente al funcionamiento diario, daña a otra persona o afecta a alguien que no ha dado su consentimiento.**

## VOYEURISMO

Observas a atrás personas sin que estas tengan su conocimiento o también buscan tener excitación a través de observar a las personas desnudadas implica

llevar a cabo los impulsos y fantasías algunos síntomas son

Observar la escena sexual Atravez de serraduras, espejos o cámaras o que los descubran es aun para ellos excitante.

## EXHIBICIONISMO

Es la exposición de los genitales en público a personas desconocidas. Actúan en

Lugares públicos como parques, restaurante, calles etc. a consecuencia del

Por el alcohol o sustancias Aproximadamente el 30% de los **delincuentes sexuales** son masculinos.

## FROTEURISMO

se caracterizan por la presencia de fantasías, impulsos o conductas sexuales mediante la utilización de un objeto o situación poco común para obtener placer. Síntomas como

Actuación sin el consentimiento de la otra persona, **Excitación sexual intensa y recurrente**, Su comportamiento no forma parte de un prelude erótico, **Elevado deseo sexual por el roce de sus genitales.**

## MASOQUISMO SEXUAL

Consiste en el disfrute sexual al ser humillado, golpeado, atado o al recibir cualquier tipo de maltrato físico o psicológico.

- A) Durante un período de menos seis meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de ser humillado, golpeado.
- B) Las fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos causan malestar, laboral y social.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DISOCIATIVOS

UNIDAD IV

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo. se caracteriza por

- Signos de estrés al ser separado del sujeto motivo del apego.
- Temor excesivo de estar solo.
- Pesadilla recurrente a la separación.

dura al menos cuatro semanas en niños y adolescentes y típicamente seis o más meses en adultos.

MUTISMO SELECTIVO

Es la inhibición del habla y comprender en una, varias o muchas situaciones sociales, incluyendo la escuela, a pesar de tener la capacidad para hablar y comprender el lenguaje.

sufren un incremento de la ansiedad en situaciones en las que se les puede llegar a pedir que hablen a determinadas personas.

causa impacto negativo significativo en el funcionamiento social y académico si no es tratado.

FOBIA ESPECÍFICA

Experimenta miedo y por tanto evitación hacia un estímulo muy concreto. Las más frecuentes son

ascensores, pájaros, petardos y fuegos artificiales, tormentas, hematología, animales, etc. Muchos acuden por

pacientes a consulta es la que engloba espacios cerrados, ascensores, habitaciones de dimensiones reducidas. etc.

FOBIA SOCIAL

Aquello que la persona evita y que le produce ansiedad, es el contacto social en cualquiera de sus manifestaciones. Los elementos más importantes son

- Preocupación por convertirse en el centro de atención.
- Temor a ser observados o comer y beber en público.
- Temor a dirigirse al público en general o, incluso, a hablar con amigos.
- Dificultad para enfrentar determinadas situaciones laborales que impliquen realizar reclamaciones a otras personas.
- Tendencia a rehuir espacios cerrados donde haya gente.

**T R A S T O R N O S D E A N S I E D A D Y D I S O C I A T I V O S**

**TRASTORNO DE PÁNICO**

Es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos síntomas

- ✚ Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca.
- ✚ 2. Sudoración.
- ✚ 3. Temblor o sacudidas.
- ✚ 4. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia.
- ✚ 5. Sensación de ahogo.
- ✚ 6. Dolor o molestias en el tórax.
- ✚ 7. Náuseas o malestar abdominal.
- ✚ 8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo.
- ✚ 9. Escalofríos o sensación de calor.

**TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA**

Es una preocupación excesiva impide llevar una vida normal.

- ✚ Incapaces de liberarse
- ✚ Excesivamente ansioso
- ✚ Sentirse preocupados por asuntos de salud

**TRASTORNO DE ANSIEDAD DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA**

se codificará y anotará por separado inmediatamente antes del trastorno de ansiedad debido a la afección médica

- A. Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico.
- B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica.
- C. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental.

**OTRO TRASTORNO DE ANSIEDAD NO ESPECIFICADO**

causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Se utilizan en

En situaciones en las que el médico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno de ansiedad específico

**T R A S T O R N O S  
D E  
A N S I E D A D  
Y  
D I S O C I A T I V O S**

**TRASTORNO DE  
IDENTIDAD  
DISOCIATIVA**

Es una persona que está bajo el control de dos identidades distintas de forma alternativa causadas por

- ✚ Trauma en la infancia
- ✚ Tensión emocional abrumada
- ✚ Algún maltrato grave
- ✚ Alguna perdida temprana de algún ser querido

**AMNESIA  
DISOCIATIVA**

Es la incapacidad repentina para recordar información personal importante y que pueda ser explicada a partir de un olvido normal.

- A. Incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario.
- B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.
- C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., alcohol u otra droga, un medicamento) u otra afección neurológica o médica
- D. La alteración no se explica mejor por un trastorno de la identidad disociativa, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo, un trastorno de síntomas somáticos o un trastorno neurocognitivo importante o leve.

**TRASTORNO DE  
DESPERSONA  
LIZACIÓN**

Es el entorno el que se percibe como extraño. Son sensaciones que

que afecte a la vida de la persona, se puede tener en algunos momentos de la vida. Síntomas como

- malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas.
- La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia.

# REFERENCIAS

Universidad del sureste (Uds.)2022

[d064f033c40c95fe363ccda2e0d0b53.pdf](#)

[https://psicologiaymente.com/clinica/trastorno](#) esquizoide-personalidad...

[https://ansiedadystres.org/que-es-el-trastorno-de-ansiedad-no-especificado](#)

[https://www. msdmanuals.com/es/profesional/trastornos-psiquiátricos..](#)

[https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/generalized...](#)

[https://psicologiaymente.com/clínica/trastorno-ansiedad-separa...](#)

[https://psicologiaymente.com/clinica/voyeurismo](#)