



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
(UDS)**

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

**PRIMER CUATRIMESTRE
GRUPO B**

ANATOMÍA Y FILOSOFÍA I

**CATEDRÁTICO
FELIPE MORALES HERNANDEZ**

**ALUMNO
JOSE EMILIANO RODAS LEEP**

**FECHA:
17 DE OCTUBRE DE 2022**

ESQUELETO AXIAL Y APENDICULAR

DIVISIONES DEL SISTEMA ÓSEO

TIPOS DE HUESO

PARTES DEL HUESO

HUESOS DEL CRANEO

HUESOS DE LA CARA

Tipos de tejido

Tejido óseo compacto

Localizados en la periferia del hueso y en la diáfisis de los huesos largos

Tejido óseo esponjoso

Se localizan en la epífisis de los huesos planos.

Periostio

Es la membrana conjuntiva que envuelve a los huesos, zona del crecimiento.

Esqueleto humano

Esqueleto axial

Se encuentra en la línea media: cabeza, cuello y tronco.

Esqueleto apendicular

Miembros inferiores.
Miembros superiores.

Huesos largos

- Fémur.
- Radio
- Húmero.

Huesos sesamoideos

- Patela.

Huesos neumáticos

- Maxilar.
- Etmoides.
- Esfenoides.

Huesos cortos

- Carpo.
- Tarso.

Huesos planos

- Escapula.
- Huesos bóveda.
- Craneal.
- Esternón.

Huesos irregulares

- Vertebrae.
- Coxis.
- Huesos de cara.

Epífisis.

Son los extremos de los huesos largos.

Metáfisis

Es la zona de unión entre la epífisis y la diáfisis.

Periostio

Es una membrana que recubre el hueso.

Diáfisis o caña

Es la parte alargada del hueso que está entre las epífisis.

Apofisis

Son los salientes del hueso, donde se insertan los músculos, ligamentos y tendones.

Endostio

Membrana de tejido conjuntivo que recubre la cavidad medular.

Craneales

- Frontal.
- Occipital.
- Etmoides.
- Esfenoides.
- Parietal.
- Temporal.

Faciales

- Maxilar superior.
- Cigomático.
- Palatino.
- Mandíbula.
- Vómer.
- Lagrimal.
- Huesos propios de la nariz.

Maxilar

Es un hueso pareado importante del viscerocráneo.

Hueso lagrimal

Es el más pequeño y el más frágil de los huesos del viscerocráneo.

Hueso palatino

Es pareado, presenta forma de L y está ubicado posterior a la cavidad nasal.

Mandíbula

Es el hueso más grande del viscerocráneo y se encuentra ubicado en la porción inferior de la cara.

Cigomático

Es un hueso pareado e irregular, ubicado en la porción superior de la cara.

Cornete nasal inferior

Es el más largo y ancho de los tres cornetes.

Hueso nasal

Es pareado, tiene forma rectangular y está ubicado medial a los procesos frontales

Vómer

Es el segundo hueso no pareado del viscerocráneo, éste se encuentra en la línea mediosagital.